

病房常用藥品儲存方式與期限

針劑藥品			
藥品	開封前	開封後	
		儲存條件	儲存期限
HYDROCORTISONE INJ. 100MG	25℃ 以下	<u>稀釋後</u> 室溫	24 小時 (廠商建議)
Alteplase (Actilyse inj)	避光，30℃ 以下	室溫	8 小時
		冷藏(2-8℃)	24 小時
Insulin	冷藏 (2-8℃)	室溫	28 天
Tetanus Toxoid (T.T.)	冷藏 (2-8℃)	冷藏 (2-8℃)	效期內之時間皆可，但須注意，如有沉澱、凍結或混濁，即不可使用。
“台裕”利都卡因 注射液 2% Lidocaine Injection 2% “Tai Yu”	25℃ 以下 避光處	25℃ 以下	3 天
		冷藏(2-8℃)	7 天
“台裕”心可寧 靜脈注射液 2% LIDOCAINE 2% FOR I.V. INJECTION “TAI YU”	30℃ 以下	除非真有必要，建議應即開即用，餘液不予保留(因無含防腐劑)	
靜注用苦息樂卡因 2%注射液 Xylocaine 2% for IV Injection	25℃ 以下	Amp 劑型，開封後即丟棄	

112.05.04 校正_Ver.1

113.03.13 更新(新增消毒液)_Ver.2

113.05.28 更新(修訂 1 個月之明確天數供臨床執行)_Ver.3

利度膚寧注射液 Lidophrine Injection	30℃ 以下 避光處	冷藏(2-8℃)	3 天 (藥品公司：需 避光密封好)
針劑藥品(續)			
藥品	開封前	開封後	
		儲存條件	儲存期限
瑋瑟肝素鈉注射液 (舊,11205 停用) Vaxcel Heparin Sodium Injection	30℃ 以下 避光乾燥處	30℃ 以下	14 天
“台裕”赫血凝注射劑 (新,11205 始用) Hesharin Injection	30℃ 以下 冷暗處保存 (可以冷藏)	冷藏(2-8℃)	5 天
		如為稀釋後 冷藏(2-8℃)	3 天
口服錠劑、膠囊			
藥品	開封前	開封後	
		儲存條件	儲存期限
ATANAAL	室溫	打開排裝鋁箔後即用完 (如排裝經剪裁須註記效期)	
Nitrostat	室溫	室溫	若避光、加蓋鎖 緊、避免高溫， 開封後保存 6 個 月
拆封的裸藥 (錠劑或膠囊)	室溫	室溫	6 個月
口服液劑			
藥品	開封前	開封後	
		儲存條件	儲存期限
Boca emulsion	室溫	請放室溫	28 天

112.05.04 校正_Ver.1

113.03.13 更新(新增消毒液)_Ver.2

113.05.28 更新(修訂 1 個月之明確天數供臨床執行)_Ver.3

Anti-Phen		(不必冷藏)	
Ibuprofen			
Secorine			
口服液劑(續)			
藥品	開封前	開封後	
		儲存條件	儲存期限
Colin	室溫	請放室溫 (不必冷藏)	28 天
BM (Liquidbrown Mixture)			
Bisolvon			
Depakine Sol.			
Hecalis Sol.			
Augmentin Syrup	室溫	<u>泡製後</u> 冷藏(2-8°C)	7 天
Zithromax Susp	室溫	<u>泡製後</u> 室溫	5 天
Mycostatin Susp	室溫	<u>泡製後</u> 室溫	7 天
眼藥水/藥膏			
藥品	開封前	開封後	
		儲存條件	儲存期限
眼藥水/藥膏(通則)	室溫	室溫	28 天

栓劑			
藥品	開封前	開封後	
		儲存條件	儲存期限
栓劑(通則)	室溫陰涼乾燥處儲存；若因太熱導致栓劑變軟時，可連同外包裝放置於冰箱冷藏 30 分鐘或放置於冷水中使其變硬		
外用藥膏			
藥品	開封前	開封後	
		儲存條件	儲存期限
外用藥膏(通則)	室溫	室溫	6 個月
LIDO JELLY	25℃ 以下 陰涼處	室溫	建議開封 超過 6 個月丟棄
外用噴劑			
藥品	開封前	開封後	
		儲存條件	儲存期限
XYLOCAINE SPRAY	25℃ 以下 (儲存於 8 °C 以下時可能 會發生沉澱)	25℃ 以下 (不用冷藏)	3 個月
吸入劑			
藥品	開封前	開封後	
		儲存條件	儲存期限
Berotec N	30℃ 以下	30℃ 以下	可存放至藥品 標示效期 (廠商回覆：如穩定放置於 30℃ 以下，乾燥、無陽光直射處)
消毒液			
藥品	開封前	開封後	

112.05.04 校正_Ver.1

113.03.13 更新(新增消毒液)_Ver.2

113.05.28 更新(修訂 1 個月之明確天數供臨床執行)_Ver.3

		儲存條件	儲存期限
金碘藥水 3800 ml	25°C 以下	25°C 以下	28 天 (廠商未做開封效期測試，本科與感管室參考醫中及他院資料共同訂定)
金碘酒精液 3800 ml	25°C 以下	25°C 以下	28 天 (廠商未做開封效期測試，本科與感管室參考醫中及他院資料共同訂定)

資料來源：藥品仿單、藥廠藥物資訊提供、台北榮總藥劑部、中榮-多劑量包裝藥品之安定性 2021、食藥署-藥物食品安全週報 2022/07/15、食藥署-教您如何保存家中藥品 2023/02/15、USP Compounding Standards and Beyond-Use Dates 2022/11



製表日期

製表單位

連絡電話

備註

113.05.28

國軍臺中總醫院
藥局

525420

如有建議及異
動，再請不吝告
知，謝謝 ☺