

發泡錠衛教單張

愛克痰發泡錠 Actein[®]、

富泌舒痰發泡錠 FLUIMUCIL[®] A

主成分	含量	中文名	圖示
Acetylcysteine	600 毫克	愛克痰發泡錠	
Acetylcysteine	600 毫克	富泌舒痰發泡錠	

作用：減少呼吸道粘膜分泌的粘稠性、蓄意或偶發之 Acetaminophen 中毒之解毒劑。

用法：發泡錠置於玻璃容器中，加入 60-100ML 的水溶解，混勻，如果需要可借助湯匙，發泡溶解後，可直接飲用。

注意事項：

1. 對本品內含成份過敏者，請勿投與。
2. 出現支氣管痙攣時必須立刻暫停使用。
3. 因本品含有甜味劑阿斯巴甜 (Aspartame)，故苯酮尿患者不宜使用。
4. 藥品可能有硫臭味，為正常特性，並非代表產品變質。

5. 勿將其它藥物與本品的溶液混在一起。

副作用：(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。) 偶爾發生胃腸障礙如噁心和嘔吐，極少出現諸如皮疹和支氣管痙攣等過敏反應。

忘記服藥怎麼辦：忘記服藥時，請於想起時立即服藥，但若已接近下次服藥時間時，請直接服用下次之劑量，切勿一次服用兩次劑量。

如何儲存：請放置於陰涼或避免日光直射之處。

服用步驟(圖示)：

1.

倒60-100cc飲用水(常溫)。



2.

將發泡錠至於水中。



3.

等待約1分鐘
讓藥錠發泡
溶解完成。



4.

直接飲用。



注意：切勿直接將藥錠口服吞下，以免造成不適。