

兒科藥水泡製衛教單張

安滅菌糖漿用粉劑 Augmentin[®]、日舒懸液用粉

Zithromax[®]、滅菌靈懸液用粉 Mycostatin[®]

主成分	含量	中文名	圖示
Amoxicillin 80 mg/ml+ Clavulanate potassium 11.4 mg/ml	457mg/5mL , 35mL	安滅菌糖 漿用粉劑	
Azithromycin	200mg/5mL , 15mL	日舒懸液 用粉	
Nystatin	100,000u/mL , 24mL	滅菌靈懸 液用粉劑	

作用：

安滅菌糖漿用粉劑：葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

日舒懸液用粉：革蘭氏陽性、陰性及厭氧菌引起之下呼吸道感染（包括支氣管炎及肺炎）皮膚及軟組織感染、中耳炎、上呼吸道感染和性傳染病。

滅菌靈懸液用粉：治療由白色念珠菌所引起之口腔、皮膚及腸內諸感染。

用法：

安滅菌糖漿用粉劑：(配置步驟參下圖示)。每次使用前需振搖，請放置於冰箱冷藏(2-8 度 C)，泡置後冷藏可保存七天，超過七天未用完請丟棄，保存期間顏色會慢慢變成棕色，只要七天內皆可正常使用。



安滅菌糖漿用粉劑配製步驟：

1. 先搖勻粉末
2. 加適量冷開水至瓶上黑線處一半
搖勻
3. 最後加冷開水至黑線處，搖勻後使用

步驟 3.：加水至此線後搖勻，配置完成

步驟 2.：加水至此後搖勻

日舒懸液用粉：請先將藥粉搖散，按住瓶蓋並依箭頭方向旋轉開啟瓶蓋，以內附針筒狀量筒取 9 mL 冷開水與藥粉充分混合均勻，即成總體積 15 mL 之懸浮液。每日於固定時間服用一次，請以針筒量取醫師指示藥量，再以針筒或湯匙餵食。每次使用前需振搖，泡置後室溫下可保存五天，超過五天未用完請丟棄

滅菌靈懸液用粉：口服用於腸道感染，漱口用於口腔念珠菌感染(漱口請與藥水接觸越久越好)。 24 劑量之瓶中加入水 23mL，用力振搖。每次使用前需振搖，泡置後室溫下可保存七天，超過七天未用完請丟棄。

注意事項：請置於兒童不可及處。如果曾對抗生素過敏請告知醫師或藥師。

副作用：(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。) 噁心、腹瀉。

忘記服藥怎麼辦：抗生素療程請務必依照醫囑按時使用完畢。

如何儲存：

安滅菌糖漿用粉劑：泡置前請放置於陰涼或避免日光直射之處，泡置後請放置於冰箱冷藏(2-8 度 C)保存。

日舒懸液用粉、滅菌靈懸液用粉：請放置於陰涼或避免日光直射之處。

