

鼻噴劑衛教單張

艾敏釋 Avamys[®] Nasal Spray

主成分	含量	中文名	圖示
Fluticasone furoate	27.5ug/dose , 120 sprays	艾敏釋鼻用噴液 懸浮劑	

作用：治療 2 歲以上的兒童、青少年與成人的過敏性鼻炎。

用法：成人及 12 歲以上青少年建議起始劑量為一天一次，兩邊鼻孔各使用 2 個噴霧劑量；當達到最佳治療效果且症狀得到控制時，將劑量減低至一天一次，兩邊鼻孔各 1 噴霧劑量，如此可能可以維持對過敏性鼻炎症狀的控制。2 至 11 歲兒童建議劑量為一天一次，兩邊鼻孔各使用 1 個噴霧劑量。

1. 在使用前鼻噴劑前，請溫和的擤一下鼻涕，以清潔鼻孔，鼻噴劑蓋子蓋上並充分搖動。
2. 置入：將頭稍微向前傾，裝置朝上，打開蓋子後將噴嘴放置於其中一個鼻孔。將噴嘴末端朝向鼻子側邊，遠離鼻中隔。
3. 按壓：吸氣時按壓按鈕，將藥品噴入鼻中。取出噴嘴，並由嘴巴呼氣。
4. 勿讓噴勿接觸眼睛，若接觸到，以清水沖洗眼睛。
5. 重覆：重覆步驟 2-4 將藥品送入另一個鼻孔；若醫師告訴您每個鼻孔使用兩次，請重覆步驟 2-4。
6. 以清潔乾燥的面紙擦拭噴嘴及蓋子內側，使用後請將蓋子蓋上。

注意事項：**(1)**下列情形須先搖勻，測試按壓直到均勻霧氣噴出：第一次使用新藥瓶時、30 天以上未使用、5 天以上未加蓋。**(2)**蓋子上有一小護片可

防止噴霧釋放按鈕被意外按壓，並可保持噴嘴清潔。勿將蓋子丟棄，不使用時請隨時將裝置蓋上。(3)噴嘴小而短，可置入鼻中，藥品由此釋出。(4)按壓並放開按鈕後，會由噴嘴釋出含定量藥品的均勻噴霧，由於此按鈕在裝置側邊，按壓時可確保噴嘴在鼻內正確位置。

副作用：(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。) 局部的皮質類固醇可能會造成：鼻出血、潰瘍、白色念珠菌感染、傷口癒合不全、白內障、青光眼、免疫抑制等。

忘記使用怎麼辦：忘記使用時，請於想起時立即使用，但若已接近下次使用時間時，請直接使用下次之劑量，切勿一次使用兩次劑量。

清潔方式：以清潔乾燥的面紙擦拭噴嘴及蓋子內側，使用後請將蓋子蓋上。

剩餘量觀測方式：由視窗可知瓶內是否仍有藥品，共 120 劑量。

如何儲存：請放置於陰涼或避免日光直射之處。

操作步驟(圖示)：

