

吸入劑衛教單張

Berotec N[®] Metered Aerosol

主成分	含量	中文名	圖示
Fenoterol	10 mcg/每 噴 · 200 噴/罐	備勞喘 定量噴霧液	

作用：本藥可預防和治療支氣管氣喘、阻塞性支氣管炎、慢性支氣管炎、氣腫或伴隨支氣管痙攣之肺支氣管障礙。主要用於緩解急性氣喘發作。

用法：在新的定量噴霧液裝置開始用前，要先下壓活塞 2 次，確定有白色霧狀氣體噴出。之後每次劑量皆按照下列圖式步驟使用。

注意事項：請依照醫師指示使用本藥品，通常每次 1-2 個定劑量，每天不得吸入超過 8 個定劑量。投與第二個劑量後，若呼吸狀況仍未改善，可能需要再投與數個劑量，此時應立即請教醫師/藥師或就近送醫。

若您正在服用藥物，特別是氣喘、感冒藥、降高血壓藥(乙型交感神經阻斷劑)、憂鬱症用藥，服藥前請先告知醫師。

副作用：(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。)

症狀	如何處理
呼吸困難、心跳加速、心悸、過敏反應(臉部、眼皮、嘴唇水腫、皮膚紅疹或蕁麻疹等)、胸痛或胸悶、多形性紅斑、高血壓、精神異常、排尿困難或癲癇發作	停藥並立即就醫
口腔或喉嚨乾及刺激感，或不正常的味覺。	每次用藥後漱口
頭痛、微顫、緊張、興奮、失眠或嗜睡、噁心、咳嗽、口乾、喉嚨有刺激感	若症狀嚴重或持續英告訴醫師


清潔方式：輔助吸藥管使用後需將殘留的藥物清

洗乾淨，勿擦乾、使其自然風乾、乾透。

剩餘量觀測方式：

如何儲存：請放置於陰涼或避免日光直射之處。

操作步驟(圖示)：



1. 先移去口含器的護蓋 	2. 將噴霧劑上下搖晃使藥品混合均勻 
3. 朝旁邊深深吐完肺中氣體 	4. 含住口含器，按壓一下後以正常速度慢慢深深地吸氣 
5. 之後閉氣 5~10 秒鐘，再慢慢地由口呼氣後，就可正常呼吸 (若呼吸沒有改善需要吸第 2 次劑量，請間隔 30~60 秒 後再重複一次步驟 2~5，不可連續按壓兩次)	