

戒必適衛教單張

戒必適 Champix®

主成分	含量	中文名	圖示
Varenicline	0.5 mg	戒必適 0.5 毫克	
	1mg	戒必適 1 毫克	

作用：戒菸輔助劑。

用法：應預設一個停止吸菸的日期，並在這個日期之前一週開始投藥。另可以選擇開始服用 Champix，然後在療程的第 8 天到第 35 天之間任選停止吸菸日期。Champix 的建議使用劑量如下表：

第 1-3 天	每日一次 0.5 mg
第 4-7 天	每日兩次 0.5 mg
第 8 天-治療結束	每日兩次 1 mg

應在飯後口服，並以一整杯水配服。

在開始使用 Champix 最初 4 週內，應配合減少 50% 的抽菸量、再於接下來 4 週內額外減少 50%，接著持續減少以達 12 週時完全戒除的目標。接著繼續治療 12 週。

注意事項：

1. 本藥須由醫師處方使用
2. 對本成分過敏者禁止使用。
3. 18 歲以下及孕婦不建議使用。
4. 不建議同時併用尼古丁替代療法。
5. 使用 Champix 期間應減少飲酒量。
6. 於駕駛或操作機械時應小心謹慎。
7. 如果產生情緒改變(包括憂鬱和狂躁)、幻覺、妄想、恐慌，以及自殺意念，應立即停止服用，並立即與醫療人員聯繫。

副作用：(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。) 噁心、異夢(怪異的夢境)、便秘、脹氣和嘔吐、嗜睡、暈眩、失去意識或注意力難以集中。

忘記服藥怎麼辦：忘記服藥時，請於想起時立即服藥，但若已接近下次服藥時間時，請直接服用下次之劑量，切勿一次服用兩次劑量。

如何儲存：請放置於陰涼或避免日光直射之處。