

口噴劑衛教單張

克炎寧加強消炎噴液劑 Coserrin[®] Throat Spray

主成分	含量	中文名	圖示
Benzydamine HCl	3 mg/ml	克炎寧噴液劑	

作用：舒解口腔及咽喉疼痛，包括下列疾病或症狀引起的疼痛：扁桃腺炎、喉嚨痛、放射治療引起的黏膜炎、鵝口瘡潰瘍、口腔與牙周手術後疼痛。

用法：成人或年齡大於 12 歲的小孩：直接噴液 2-4 次於疼痛紅腫部位後緩慢吞服，如有必要每 1.5-3 小時可重複使用。年齡 6-12 歲的小孩：直接噴液 2 次於疼痛紅腫部位後緩慢吞服，如有必要每 1.5-3 小時可重複使用。

6 歲以下孩童：不建議使用。除非在醫師指示之下，連續治療不應超過 7 天。

注意事項：本品含阿斯巴甜(aspartame)賦形劑，苯酮尿症患者不宜使用。若咽喉疼痛為細菌感染或病毒感染，使用本品外應考慮其他抗菌藥的治療。

副作用：(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。) 最常見的不良反應是口腔的麻木感、偶爾的灼熱和刺痛感。

清潔方式：使用後，用乾淨的面紙擦乾噴嘴以避免阻塞。

如何儲存：請放置於陰涼或避免日光直射之處。