

口服液衛教單張

帝拔癲口服液 Depakine® Oral Solution

主成分	含量	中文名	圖示
Sodium valproate	200 毫克/毫升 (40 毫升/瓶)	帝拔癲口服液	

作用：情緒穩定劑、治療癲癇之大發作、小發作、混合型及顳葉癲癇。

用法：

1. 如何服用？

每次服用 _____ CC，故量筒需抽取至 _____ mg

一天服用 _____ 次

(☐早餐 ☐午餐 ☐晚餐 ☐睡前，用水稀釋後隨餐服用)




量筒 玻璃藥瓶

2. 藥盒內含一**玻璃溶液藥瓶**藥盒與專用抽取**量筒**，量筒標示為毫克數(mg)。

使用前須將藥袋上所處方的毫升(mL)數「乘上 200」以轉換為毫克數。

mL 換算 mg 請參考以下表格。



注意事項

1. 應以少量非發泡性飲料稀釋後服用。
2. **懷孕**期間使用本藥品，可能造成胎兒神經管缺陷和其他結構異常；若有懷孕、準備懷孕、哺乳或肝病，請告知醫師。
3. 可能有**昏昏欲睡**的風險，特別是在使用多種抗癲癇藥物治療或和其他可能會加強昏昏欲睡症狀藥物併用治療時；應注意避免從事開車或操作機械等需要警覺力的工作。
4. 治療期間**不建議服用酒精性飲料**，以免增加不良反應發生機會。

副作用：腸胃不適(腹痛、腹瀉、厭食、噁心、消化不良、嘔吐)、嗜睡、頭暈、頭痛、輕微顫抖。(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療)

忘記使用怎麼辦：忘記使用時，請於想起時立即使用，但若已接近下次使用時間時，請直接使用下次之劑量，切勿一次使用兩次劑量。

如何儲存：

1. 存放於在室溫下(低於 25°C)，避免陽光直射處。
2. 開封後保存期限為一個月。

