

吸入劑衛教單張

帝舒滿定量噴霧劑 Duasma[®] Metered Dose Inhaler

主成分	含量	中文名	圖示
Budesonide	200 mcg/每定量，200 定量/瓶	帝舒滿定量噴霧劑	

作用：成人及大於 6 歲以上的兒童之支氣管氣喘。

用法：成人及大於 12 歲之孩童：通常每日 2 次，每次 1-4 個劑量。6-12 歲兒童：通常每日 2 次，每次 1-2 個劑量。

全新的定量噴霧器在使用前，需搖動後對空噴壓 2 下。之後每次劑量皆按照下列圖式步驟使用。隨瓶附贈吸入輔助器，建議需長期使用的話請用輔助器，可以降低藥物在全身性的吸收，且改善藥物在肺部的沉積量。

注意事項：請依照醫師療程正確使用，不可自行調整劑量或增加次數。請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是中度到重度的支氣管擴張症。使用完後請以清水漱口，減少念珠菌感染造成鵝口瘡。

副作用：(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。) 喉部輕微刺激，咳嗽及可逆性的聲音沙啞，但一般都不嚴重，這些副作用可能因使用輔助器而改善，若症狀惡化且無法




忍受請回診。

清潔方式：建議每週清潔一次，以乾面紙或布清理乾淨，吸入器不可用水清洗。

剩餘量觀測方式：本藥無剩餘量視窗，建議可在瓶身上貼標籤紀錄使用時間。

如何儲存：請放置於陰涼或避免日光直射之處。

操作步驟(圖示)：

方法1. 未使用輔助器：	
1. 先移去口含器的護蓋。 	2. 每次使用前必須充分搖動本藥。 
3. 先緩慢對旁邊吐氣，排除肺內空氣。 	4. 含住噴嘴，按壓一下後 同時深深慢慢地吸氣 。 5. 吸完氣候閉氣數秒(5~10秒鐘)。 6. 移除噴嘴後即可正常呼吸。 
(若需要吸第2次劑量，請間隔30~60秒後再重複一次步驟3~7，使用後蓋回保護蓋，不可連續按壓兩次)	