

鼻噴劑衛教單張

鼻適暢噴鼻液 Dymista[®] Nasal Spray

主成分	含量	中文名	圖示
Azelastine hydrochloride	137 mcg/噴	鼻適暢噴鼻液	
Fluticasone propionate	50 mcg/噴		

作用：治療 6 歲以上兒童及成人之中度至重度過敏性鼻炎的相關症狀。

用法：每次兩鼻孔各噴 1 下，每天使用二次(早上和晚上)。可以依照症狀嚴重度調整用量，但每天用量不可超過上述建議劑量。每次使用前輕輕震搖瓶子。準備使用前的空噴：首次使用 Dymista 需先空噴 6 下或直至出現均勻細霧再開始使用。當 Dymista 14 天以上未使用，需空噴 1 下或直到出現均勻細霧再使用。

注意事項：避免將 Dymista 噴到眼睛。如果噴到眼睛，用清水沖洗眼睛至少 10 分鐘。

副作用：(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。)頭痛、發熱、疼痛、味覺障礙、腹瀉和流鼻血。

忘記使用怎麼辦：忘記使用時，請於想起時立即使用，但若已接近下次使用

時間時，請直接使用下次之劑量，切勿一次使用兩次劑量。

清潔方式：以清潔乾燥的面紙擦拭噴嘴，使用後請將蓋子蓋上。

如何儲存：請放置於陰涼或避免日光直射之處。

