

憶思能貼片藥品衛教單張

憶思能穿皮貼片 5 Exelon[®] Patch 5、

憶思能穿皮貼片 10 Exelon[®] Patch 10

主成分	含量	中文名	圖示
Rivastigmine	9mg	憶思能穿皮貼片 5	
Rivastigmine	18mg	憶思能穿皮貼片 10	

作用：輕度至中度阿滋海默氏病之癡呆(失智)症。

用法：

1. Exelon Patch 僅供貼於完整的皮膚上經皮吸收使用。
2. Exelon Patch 每天一次，貼於清潔、乾燥、無毛髮、完整健康的皮膚上，確實向下壓平30秒直至貼片邊緣都黏牢。貼片黏貼的地方應選擇不會因穿著而磨擦掉貼片的部位。建議黏貼的部位為上背或下背部，若無法貼在背部時，可貼於上臂或胸部。貼片不可黏貼於剛擦了乳霜、乳液或粉末的皮膚上。
3. 貼片不應貼於發紅、受刺激或割傷的皮膚。

4. 每24小時應更換新的貼片。每一次只能貼一片貼片（在貼新的貼片前，應先將前一天的貼片撕下來）。若貼片掉落或忘記貼了，立刻貼上新的貼片，然後在隔天給藥的時間更換貼片。
5. 雖然貼片可連續貼於相同的部位（例如上背部不同的點），仍建議每天變換不同的部位黏貼，以避免對皮膚產生刺激性。相同的點於14 天內不可再貼新的貼片。
6. 貼片於洗澡及酷熱的天氣等情況下仍可繼續使用。但應避免長時間曝露外部熱源，例如過度日曬、三溫暖、日光浴。
7. 使用過的貼片應放在原來的保護袋中，小心丟棄，避免被寵物或兒童觸碰。
8. 撕除貼片後，請用肥皂及清水將手洗淨。如果處理貼片後，手觸碰到眼睛或是眼睛發紅，請立刻用大量的清水沖洗，如果症狀未改善，請尋求醫師協助。

注意事項：

1. 病患如果對於 Rivastigmine 或其他 Carbamate 衍生物過敏，則禁止使用。
2. 有肝功能不全、體重偏輕(< 50 公斤)、潰瘍病史或正在服用非類固醇類消炎藥、氣喘或肺阻塞性肺病病人使用憶思能穿皮貼片時需小心。
3. 使用此藥物患者應避免駕駛及操作機械。
4. 憶思能穿皮貼片可能增加或引發錐體外症狀（尤其是顫抖，錐體外症狀包括肌張力異常、肌肉攣縮、眼球上吊、身體扭曲、靜坐不能、類巴金

森氏症等)，如發生嚴重反應，請立即回診醫師。


5. 使用憶思能穿皮貼片能會造成過敏性接觸性皮膚炎，若黏貼部位反應擴散至貼片以外的範圍、出現更嚴重的局部反應(例如紅斑、水腫、丘疹、水泡更嚴重)，請立即停止使用，並回診醫師。

副作用：(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。) 明顯的胃腸道副作用包括噁心嘔吐、厭食、體重減輕、過敏性接觸性皮膚炎、心跳徐緩。


忘記使用怎麼辦：如果忘記用藥時，應立即貼上新的貼片，到了隔天的給藥時間，再換貼另一片貼片，不可同時貼二片來補償忘記貼的劑量。

如何儲存：請放置於陰涼或避免日光直射之處。


操作步驟(圖示)：



- 每片貼片封存於保護袋中。僅在準備使用貼片時，才可打開封袋。
沿虛線剪開封袋，打開後取出貼片。保留封袋稍後使用。剪切時避免損及貼片或過度凹折貼片。



- 貼片的黏性面（接觸面）覆蓋有保護襯片。將保護襯片的一邊剝開。請勿讓您的手指碰觸貼片的黏性面。



- 將貼片的黏性面貼在上或下背部、或上臂、或胸部，然後將保護襯片的另一邊剝開。



- 用手掌按緊貼片至少 30 秒，確保各邊緊密黏附。

