

Forteo 病人衛教 check list

準備物品

- ◆ 衛教包 (含說明書、衛教**同意書**) → 「同意書」撕下收回, 「告知聲明」需還病人
- ◆ Forteo 注射筆 Sample、針頭 * 1
- ◆ 酒精棉片 * 2
- ◆ 保冰袋(美沙冬那側桌面底下)、冰寶(冷藏冰箱最底層)

前置作業

◆ 填寫衛教**同意書**

- 同意即表示願意將個人資料提供給骨穩中心, 但可隨時撥打服務專線要求從連絡名單中除名。
- 同意衛教可獲贈**保冰袋**。(藍色保冰袋裡面應該要有附冰寶, 拿出來跟冷藏冰箱底層的冰寶交換)

◆(1130827 新增)總結: 其實有拿保冰袋就需要寫同意書(有獲贈東西)

- 健保病人: 獲得保冰袋、每月電話關懷衛教
- 自費病人: 獲得保冰袋、每月電話關懷衛教、Forteo 買三送一(持醫院收據至合作院所領取)

衛教流程 - 重點提示

①衛教包裡最大張的衛教單:

- ◆ 衛教單正面: 注射筆圖解 - 注射筆需冷藏, 不可冷凍。若藥物結冰則不可再使用。
- ◆ 衛教單內頁: 注射筆使用說明, 請逐步操作講解
 - 操作者使用前需先清潔雙手。
 - 酒精棉片 1 片消毒病人注射部位, 1 片消毒注射筆底端紅色橡皮塞。
 - 施打部位: 建議**腹部**輪流施打即可 (即圖上紅色 A、B 兩處), 因大腿部位通常較不順手。
 - 使用過的針頭以塑膠桶收集後帶回醫院回收。
- ◆ 衛教單背面: 病人常有疑問, 逐項說明
 - 第 3 點: 一支骨穩可使用 28 天, 之後黑色注射鈕即無法拉開(此時藥筒內仍可能有少量液體)。

②說明書 - 第 5 頁: 正確握筆方式。

- 第 11 頁: 如何**重設骨穩**, 請務必詳細說明。
- 第 26~37 頁: 注射紀錄表 - 可請病人每日記錄注射部位 (如: 右上 1、左下 3)。
- 第 38~43 頁: 注射筆使用紀錄表 - 請病人填上開始使用日期。
- 其餘詳細問答可請病人自行閱讀。

其他提醒

- ◆ 若有任何問題 (如: 忘記冷藏、注射筆有異常...), 皆可請病人撥打 0800 專線詢問。
- ◆ 若需再次衛教, 可撥打 0800 專線提出到府完整衛教之需求。
- ◆ 若藥師無法當場衛教, 可請病人完整填寫兩張同意書後, 我們會把資料提供給業務並安排衛教。
- ◆ **骨穩買三送一申請流程**(1140414 補充說明)
 1. 填寫同意書加入骨穩骨鬆關懷小組

2. 請妥善保存收據(建議拍照留存電子檔，若收據遺失需再向醫院申請)
3. 累積於醫院購買三支後，至超商傳真收據(傳真專線:02-87728782)
4. 傳真後致電 0800-889-900(周一至周五)，確認是否收到傳真
5. 等候專人與您聯繫(約 1-3 個工作天)，於指定時間地點領取藥品(通常為家中附近有簽約的特約藥局)

*若有疑問，可留病人資訊(姓名、電話)給裕利負責人：0905717787 廖家萱 Sandy

*等於前 3 支在醫院購買，都買完了第 4 支則向公司免費申請

*第 4 支 Forteo 因沒有配給針頭，建議針頭可在前 3 支時於醫院門診多開立

修正說明及補充(112.08.23)

- ◆ 刪除「贈送鈣片」活動
- ◆ 刪除「P1NP 檢測同意書」：目前是否檢測 P1NP 由醫師及病人決定
- ◆ 如病人符合健保給付規定，不用自費購買 Forteo，廠商仍希望能填寫同意書，方便計算保冰袋數量
- ◆ 目前最新給付規定如下(113.08.27)：

5.6.2. Parathyroid hormones and analogues (副甲狀腺素及類似劑)： teriparatide 注射劑(101/7/1、110/5/1)

限用於

1. 停經後骨質疏鬆婦女。
 2. 原發性或次發於性腺功能低下症造成骨質疏鬆之男性。
 3. 需符合下列條件：
 - (1)引起脊椎或髖部多於2 (含)處骨折，經評估(須於病歷載明)無法耐受副作用或在持續配合使用抗骨質吸收劑至少連續12個月的情況下仍發生至少1處新的骨折之病患。
 - (2)骨質疏鬆之程度，須經 DXA 檢測 BMD 之 T-score 小於或等於-3.0。
 4. 使用不得超過18支並於二年內使用完畢，使用期間內不得併用其他骨質疏鬆症治療藥物。
 5. 與 romosozumab 僅得擇一使用，除因耐受性不良，不得互換。(110/5/1)
- 備註 DXA: Dual energy X-ray absorptiometry
BMD: Bone mineral density

1120829 業代筆記：

1. Forteo 大概在第 9 個月 maybe 才會有明顯效果
2. 目前 FDA 跟臺灣都改掉最多使用 2 年的限制，高度骨折風險等病人可使用超過 2 年