

Lagevrio[®] 新冠肺炎口服抗病毒藥物衛教單張

主成分	含量	外觀	圖示
Molnupiravir	200mg	瑞典橘色膠囊，印有:82字樣	

使用對象：用於治療輕度至中度SARS-CoV-2感染且具以下任一重症風險因子，未使用氧氣且於發病五天內之成人病患，且無法使用其他建議藥物者。

重症風險因子：年齡 ≥ 65 歲、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病(不含高血壓)、慢性肺疾(間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病)、結核病、慢性肝病(肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性肝炎)、失能(注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷)、精神疾病(情緒障礙、精神分裂症)、失智症、吸菸(或已戒菸者)、BMI ≥ 30 (或12–17歲兒童青少年BMI 超過同齡95%)、影響免疫功能之疾病(HIV感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑)。

作用：抑制RNA mutagenesis，抑制covid-19病毒複製酶。

服用方式：

每12小時服用4顆molnupiravir膠囊(如上午8點和晚上8點)，持續服用五天。

副作用：(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療)

腹瀉(2%)、噁心(1%)、暈眩(1%)，罕見副作用，目前未知。

注意事項：

1. 可隨餐或空腹服用，應整粒吞服，不可打開膠囊。
2. 如果您在平常服用的 10 小時內漏服一劑 Lagevrio，一旦您記起來就請立即服用它。如果您漏服一劑超過 10 小時，請跳過漏服的劑量，並在您例行的時間服用下一劑。請勿同時服用 2 劑 Lagevrio。
3. 18歲以下兒童：不建議使用，可能會影響骨骼生長與軟骨形成。
4. 治療期間，至停藥4天後，不建議哺乳。
5. 不建議用於孕婦，建議於最後一次服藥後：男性3個月內；女性4天內應進行有效避孕。