


藥品衛教單張

Glyxambi®

主成分	含量	中文名	圖示
Empagliflozin / Linagliptin	25/5mg	糖順平膜衣錠	

作用： 治療第二型糖尿病。

用法： 建議於每天固定時間（如早餐時）服用，每次服用 1 錠，可空腹或與食物同服。

注意事項：

- **禁忌與疾病史：** 對本藥任一成分過敏者禁用；有嚴重腎功能不全、洗腎、心衰竭或胰臟炎病史者，使用前應告知醫師，由醫師評估是否適合使用。
- **孕哺乳期：** 本藥不建議用於懷孕（尤其第二、三孕期）或哺乳期間；若計畫懷孕、已懷孕或正在哺乳，請先諮詢醫師。
- **感染警訊：** 若有泌尿道或生殖器感染徵狀（如排尿疼痛、血尿、異常分泌物或會陰部紅腫）應盡快就醫。

- **脫水預防**：請保持充足水分攝取，避免因發燒、嘔吐、腹瀉或激烈運動等情況導致脫水。

副作用：(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。)

- **常見副作用**：可能出現泌尿道感染、生殖器感染、上呼吸道感染、鼻咽炎、口渴、排尿次數增加等症狀。
- **嚴重副作用**：罕見但需注意糖尿病酮酸中毒 (表現為嗜睡、呼吸急促、噁心嘔吐等，見) 及嚴重皮膚反應 (如皮膚起水泡、糜爛等)。如出現上述嚴重症狀，請立即就醫。

忘記服藥怎麼辦：

1. 發現時距離元服藥時間在 12 小時內，可補吃當次劑量。
2. 若已超過 12 小時，則略過不要服用，待下次服藥時間吃當次劑量，請勿一次服用雙倍劑量。



如何儲存：藥品請置於室溫保存，避免存放於高溫或潮濕處，存放於兒童不易取得之處。