



降血壓藥品衛教單張

甲型阻斷劑 α -blocker

商品名	主成分	含量	中文名	圖示
Kinxaben	Doxazosin	2mg	心血平錠	
Doxaben XL	Doxazosin	4mg	可迅持續錠	
Hytrin	Terazosin	2mg	定脈平錠	
Telowsin	Terazosin	2mg	脈降錠	
Urief	Silodosin	4mg	優列扶	
Tamso SR	Tamsulosin	0.2mg	替你坦舒	
Harnalidge OCAS	Tamsulosin	0.4mg	活路利淨 OCAS 持續錠	
Tamokas	Tamsulosin	0.4mg	益利舒持續錠	

作用：高血壓、良性前列腺肥大。

用法：請遵照醫師指示的用法及藥量使用。必須每日固定時間規律服用，未經醫師許可，千萬不可擅自停藥。

注意事項：

1. 如果曾發生藥物過敏，請先告知醫師。
2. 孕婦、預備懷孕或授乳婦用藥前，請先告知醫師。
3. 請先告知醫師目前正在服用的其他藥品(包括指示用藥、成藥、中草藥或健康食品，尤其是其他降血壓藥及鎮靜劑)，以避免藥物交互作用。切勿自行購買藥物服用。
4. 服藥前七天發生姿態性低血壓的機率較大，有低血壓症狀應立即坐下或躺下，想站起或坐起時，請緩慢轉換姿勢。
5. 服用此類藥物有產生思睡、嗜眠，開車或操作重型機械應謹慎小心。
6. 可迅、活路利淨 OCAS、益利舒為持續釋放錠，應整粒吞服，勿撥半及磨粉。

副作用：(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。) 頭暈頭痛、水腫、疲勞、姿勢性低血壓、射精障礙。

忘記服藥怎麼辦：忘記服藥時，請於想起時立即使用，但若已接近下次使用時間時，請直接使用下次之劑量，切勿一次使用兩次劑量。

如何儲存：請放置於陰涼或避免日光直射之處。