

# 降血壓藥品衛教單張

## 血管擴張劑

| 商品名        | 主成分         | 含量   | 中文名   | 圖示                                                                                    |
|------------|-------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Apresoline | Hydralazine | 25mg | 阿普利素寧 |    |
| Loniten    | Minoxidil   | 10mg | 洛寧錠   |   |
| Sigmart    | Nicorandil  | 5mg  | 喜革脈   |  |
| Nirandil   | Nicorandil  | 5mg  | 利可心   |  |

**作用**：高血壓。

**用法**：請遵照醫師指示的用法及藥量使用。必須每日固定時間規律服用，未經醫師許可，千萬不可擅自停藥。

**注意事項**：

1. 如果曾發生藥物過敏，請先告知醫師。
2. 孕婦、預備懷孕或授乳婦用藥前，請先告知醫師。
3. 請先告知醫師目前正在服用的其他藥品(包括指示用藥、成藥、中草藥或

國軍臺中總醫院藥劑科 關心您  
藥物諮詢專線：04-23933786

健康食品，尤其是其他降血壓藥及鎮靜劑)，以避免藥物交互作用。切勿自行購買藥物服用。

4. 慢速乙醯化患者使用 Apresoline 可能產生紅斑性狼瘡樣症候群(胸痛、虛弱、關節痛、皮膚疹、喉嚨痛等)，如發生以上情形，請立即回診醫師。
5. 使用 Loniten 可能發生多毛症(發生於治療後 3-6 週，細體毛會加長、變粗和色澤加深)及體液滯留情況，如發生嚴重副作用請告知醫師。
6. Nicorandil 請勿與威而鋼(Viagra)、樂威壯(Levitra)、犀利士(Cialis)等藥物並用。
7. 服用降血壓藥後，若持續頭痛，請詢問醫師，勿擅自服用頭痛藥或增減藥品之劑量。

**副作用**：(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。)

Apresoline：紅斑性狼瘡樣症候群、心絞痛、頭痛、心跳加速、姿態性低血壓、面潮紅、周邊神經炎、過敏。

Loniten：反射性心搏過速、心絞痛、多毛症、體液滯留、水腫。

Nicorandil：頭痛、噁心嘔吐、眩暈、面潮紅、倦怠。

若服用降血壓藥後，發生眩暈、虛弱、面潮紅、心跳快速、低血壓(收縮壓 < 90mmHg)，請立刻躺下或坐下，此症狀會在連續治療期間逐漸消失。

**忘記服藥怎麼辦**：忘記服藥時，請於想起時立即使用，但若已接近下次使用時間時，請直接使用下次之劑量，切勿一次使用兩次劑量。

**如何儲存**：請放置於陰涼或避免日光直射之處。