



降血壓藥品衛教單張

利尿劑

商品名	主成分	含量	中文名	圖示
Uretropic	Furosemide	40mg	通舒錠	
Burinex	Bumetanide	1mg	必瑞錠	
Shyllouh	Spironolactone (保鉀)	25 mg	使洛利通錠	
Amizide	Amiloride (保鉀) /Hydrochlorthiazide	5/50mg	安立壓錠	
Hydrochlorothiazide	Hydrochlorothiazide	50mg	氫氯治錠	
Acetazolamide	Acetazolamide	250mg	乙醯偶氮胺錠	
Exforge HCT	Amlodipine/Valsartan /Hydrochlorothiazide	5/160/12.5mg	力安穩 膜衣錠	
Sevikar HCT	Amlodipine/Olmesartan /Hydrochlorothiazide	5/20/12.5mg	舒脈優 膜衣錠	

Co-Diovan	Valsartan/ Hydrochlorothiazide	80/12.5mg	可得安穩	
Coaprovel 150/12.5mg	Irbesartan/ Hydrochlorothiazide	150/12.5mg	可普諾維錠 150/12.5 毫克	
Coaprovel 300/12.5mg	Irbesartan/ Hydrochlorothiazide	300/12.5mg	可普諾維錠 300/12.5 毫克	
Losa&Hydro	Losartan/ Hydrochlorothiazide	50/12.5mg	那寶穩錠	
Micardis Plus	Telmisartan/ Hydrochlorothiazide	40/12.5mg	複必康平	

作用：水腫、利尿、高血壓；原發性醛類脂醇過多症(Spironolactone)。

用法：請遵照醫師指示的用法及藥量使用。必須每日固定時間規律服用，未經醫師許可，千萬不可擅自停藥。

注意事項：

1. 如果曾發生藥物過敏，請先告知醫師。
2. 孕婦、預備懷孕或授乳婦用藥前，請先告知醫師。
3. 請先告知醫師目前正在服用的其他藥品(包括指示用藥、成藥、中草藥或健康食品，尤其是其他降血壓藥及鎮靜劑)，以避免藥物交互作用。切勿自行購買藥物服用。
4. 連續服用時，需定期檢查電解質是否失調。

5. 急性腎炎、肝腎功能不全、Digoxin 服用期間使用利尿劑，應特別注意血鉀情形。
6. 服藥期間請勿過度飲酒。
7. 利尿劑可能引起頭暈，如開車、操作機械時應小心。
8. 鉀離子的正常血漿濃度為 3.5-5 mEq/L，**低血鉀症**是血鉀濃度小於 3.5 mEq/L，症狀包括：抽筋、虛弱、不適、肌痛、低血壓、心電圖改變、心搏過速、心律不整。**高血鉀症**是血鉀濃度超過 5.5mEq/L，症狀包括：感覺異常、肌肉無力、疲倦，四肢麻痺、心搏過慢、休克、心電圖異常等。如發生嚴重低血鉀或高血鉀症狀，請立即回診醫師。
9. 利尿劑會減弱糖尿病藥品效果，請糖尿病患者按時服用血糖藥並注意血糖變化。
10. 使用 Hydrochlorothiazide 後如發生急遽的視力下降或眼部疼痛（通常發生在開始用藥後數小時至一週內），請立刻停止使用本藥並回診醫師。

副作用：(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。) 頭痛、噁心嘔吐、感覺異常、疲倦無力、肌肉痙攣、低血壓、男性女乳症和胸部擴大(男女皆然)。

忘記服藥怎麼辦：忘記服藥時，請於想起時立即使用，但若已接近下次使用時間時，請直接使用下次之劑量，切勿一次使用兩次劑量。

如何儲存：請放置於陰涼或避免日光直射之處。