

吸入劑衛教單張



英克賜易利達乾粉吸入劑 Incruse Ellipta® Inhalation Powder

主成分	含量	中文名	圖示
Umeclidinium	55mcg/puff ; 30puff/box	英克賜易利達乾粉吸入劑	

作用：慢性阻塞性肺病（COPD）患者之氣道阻塞症狀的維持治療用藥

用法：Incruse Ellipta 應每天於相同時間吸入一次。每 24 小時不可使用 Incruse Ellipta 超過 1 次。

注意事項：

1. 本藥無法快速緩解急性發作時之症狀，故在急性發作時不應使用本藥。
2. 即使沒有症狀也應常規使用，才能達到最佳臨床效益。
3. 有以下情況，使用本藥前須告知您的醫師：曾對本藥或乳蛋白過敏反應者、慢性肺阻塞控制情形變差時、心血管疾病、冠狀動脈功能不全、心律不整、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、低血鉀症、開放性或不活動性肺結核病人、狹角性青光眼的患者、尿滯留問題、懷孕或正在授乳。
4. 要吸藥時才可以打開蓋子，避免損失藥物。

副作用：副作用並不常見，但還是可能發生。如：頭痛、頭暈、心動過速、牙痛、上腹痛、肌痛、咳嗽、鼻咽炎。

操作步驟(圖示)：

1. 打開吸口蓋。
2. 先向外吐一口氣
(勿朝吸嘴吐氣)。
3. 將吸嘴放入嘴唇內，
以長而穩定的方式
深吸一口氣。
4. 吸氣完畢後自口中
移去吸入器，閉緊雙



唇，盡可能摒住這口氣，3-4 秒（或在您舒適的前提下盡量摒住這口氣）。

5. 閉氣後恢復正常呼吸，即完成一次吸入劑量。
6. 關閉吸入器。

清潔方式：使用乾面紙。但不需要常態性的清潔。

如何儲存：

1. 開封後 6 週內使用完，請在吸入器標籤註記開封日期。
2. 藥品請置於室溫保存，避免存放於高溫或潮濕處。
3. 請將藥品存放於兒童不易取得之處所。