

藥品衛教單張

Jardiance DUO®

主成分	含量	中文名	圖示
Empagliflozin / Metformin	12.5/850mg	恩美糖膜衣錠	

作用：適用於單用 metformin 或 empagliflozin 時血糖控制不佳，或早已同時接受 metformin 及 empagliflozin 合併治療而狀況穩定者的第二型糖尿病成人病人，在飲食與運動外，做為改善血糖之輔助治療。Empagliflozin 用於具第二型糖尿病且已有心血管疾病的成人病人時，可降低心血管原因死亡的風險。然而，本品恩美糖用於具第二型糖尿病且已有心血管疾病的成人病人時，其降低心血管原因死亡的風險的有效性尚未被建立。

用法：

1. 針對體液容量減少且先前未接受 empagliflozin 治療的病人，建議在開始服用恩美糖前先矯正此一狀況。
2. 請根據病人治療現況調整恩美糖的初始劑量：
 - 對於正在接受 metformin 治療的病人，請換成內含 empagliflozin

5mg 及與近似之 metformin 每日總劑量的恩美糖；

- 對於正在接受 empagliflozin 治療的病人，請換成內含 metformin 500 mg 及近似之 empagliflozin 每日總劑量的恩美糖；
- 對於已同時接受 empagliflozin 和 metformin 治療的病人，請換成各成分所含每日總劑量皆與原來相同的恩美糖。

3. 請一天兩次隨餐服用恩美糖；劑量調升應逐步以減少 metformin 引起的腸胃副作用。
4. 應根據有效性及耐受性調整劑量，但不可超過最高建議每日劑量（metformin 為 2000 mg，empagliflozin 為 25 mg）。

注意事項：

1. 主動告知醫師您所有服用之降血糖藥物，並勿擅自服用未經醫師許可之藥物。
2. 有以下情況請告知醫師：有肝、腎疾病、懷孕或授乳。
3. 服藥期間飲食及運動應規律，定量且定時。延遲飲食或過度運動會引起低血糖。
4. 服藥期間如有高血糖症狀（極度口渴、多尿、皮膚乾燥、複視、噁心嘔吐等）或曾出現低血糖症狀（極度飢餓、焦慮、皮膚蒼白、冒冷汗、視力模糊或意識混淆等）時，應於回診時主動告知醫師，以利劑量之調整。
5. 請確實遵從醫囑回診及實行相關檢驗，如：血糖、尿糖，以便醫師評估療效或調整劑量。

孕婦用藥等級及注意事項：

不建議在懷孕期間，尤其是在第二孕期和第三孕期時使用本藥。

計畫懷孕注意事項：

如妳計畫準備懷孕，或在服藥期間已懷孕，就診時請務必告知醫師。

嬰兒餵母乳時注意事項：

不建議在哺乳期間使用。

飲食注意事項：

1. 遵照醫師或營養師的運動和膳食建議，食用健康的膳食。
2. 服藥期間避免飲酒。

使用禁忌：

1. 重度腎功能不全（腎絲球過濾率估計值低於 30 mL/min/1.73 m²）、末期腎病（ESRD）或透析病人。
2. 急性或慢性代謝性酸中毒，包括糖尿病酮酸中毒。
3. 對 empagliflozin、metformin 或恩美糖任何賦形劑產生過敏反應，例如曾發生血管性水腫反應。

副作用：（藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。）


1. 本藥品和其他降血糖藥品，如 sulfonylurea 類降血糖藥與胰島素，可能會產生低血糖。當發生嚴重低血糖時，如痙攣、昏迷，不可進食，立即送急診。若有其他低血糖症狀(虛弱、昏昏欲睡、昏亂、突然很餓、

冒冷汗、顫抖、視力模糊、心悸、頭痛等)，立即進食含有糖的食物或飲料(如糖果或果汁)，若未改善，則應送急診。

2. 若出現以下情形請立即就醫：若出現過敏反應(如紅疹、蕁麻疹、臉部/嘴唇/喉部腫脹 呼吸困難 黏膜破或疼痛) 腎功能異常症狀(排尿困難、血尿、尿量急劇改變)、泌尿道感染(如血尿、排尿疼痛、發燒、骨盆疼痛或下腹疼痛)、生殖器感染(如陰道有滲出物或搔癢、陰莖/龜頭疼痛、腫脹、出疹或有滲出物)。
3. 本藥其他副作用包含：高血脂、口渴、噁心、尿量增加。當這些症狀嚴重或持續時，請就醫。
4. 低血壓、急性腎臟損傷及腎功能不全。

✚ 忘記服藥怎麼辦：

想起來的時候，儘快補吃，但若已接近下次服藥時間時，則不要補吃，只服用一次劑量即可，千萬不要服用雙倍的劑量。



✚ 藥品之儲存：

儲存 30°C以下，並放在孩童碰不到的地方。

✚ 其他：

1. 要定期回診，您的醫師可能會幫您做一些檢查，以確定您對本藥治療的反應。不要讓任何人服用你的藥物。
2. 本藥可能影響部分檢驗數值，應先告知醫師您有在使用本藥。

※若您有使用藥物之相關問題，請洽詢藥物諮詢專線詢問藥師或您的醫師。

