

藥品衛教單張

Jardiance®

主成分	含量	中文名	圖示
Empagliflozin	10 mg	恩排糖膜衣錠	

作用：本藥透過促進葡萄糖從尿液排出以治療第二型糖尿病。

用法：

1. 本藥通常每日服用一次，請依照醫師指示服用。飯前或飯後服用。本藥需規律服用，除非產生嚴重低血糖，否則不應自行停藥。

注意事項：

1. 在服用此藥前，請告訴醫師或藥師，您是否對任何藥物有過敏反應。
2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物(尤其是其他治療糖尿病的藥品)及病史(特別是腎臟疾病、肝臟疾病、胰臟炎病史與泌尿道感染)。
3. 為使糖尿病受到良好控制，請遵醫囑控制飲食、飲酒量、檢查血糖、糖化血色素及尿糖，運動應規律。
4. 應適時補充水分及維持個人衛生，以預防體液流失造成的低血壓和泌尿道感染。
5. 服用本藥期間若要進行手術，應先告知醫師、牙醫師。

6. 本藥可能會導致泌尿道感染與生殖器感染。泌尿道感染的症狀包含血尿、排尿疼痛、發燒、骨盆疼痛或下腹疼痛。女性生殖器感染的症狀包含陰道有滲出物或搔癢；男性生殖器感染包含陰莖/龜頭疼痛、腫脹、出疹或有滲出物。當出現相關症狀時，應就醫。

 孕婦用藥等級及注意事項：

不建議在懷孕期間，尤其是在第二孕期和第三孕期時使用本藥。

 計畫懷孕注意事項：

如妳計畫準備懷孕，或在服藥期間已懷孕，就診時請務必告知醫師。

 嬰兒餵母乳時注意事項：

不建議在哺乳期間使用。

 飲食注意事項：

1. 遵照醫師或營養師的運動和膳食建議，食用健康的膳食。
2. 服藥期間避免飲酒。

 副作用：(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。)


1. 本藥品和其他降血糖藥品 如 sulfonylurea 類降血糖藥與胰島素 可能會產生低血糖。當發生嚴重低血糖時，如痙攣、昏迷，不可進食，立即送急診。若有其他低血糖症狀(虛弱、昏昏欲睡、昏亂、突然很餓、冒冷汗、顫抖、視力模糊、心悸、頭痛等)，立即進食含有糖的食物或飲料(如糖果或果汁)，若未改善，則應送急診。
2. 若出現以下情形請立即就醫：若出現過敏反應(如紅疹、蕁麻疹、臉部/嘴唇/喉部腫脹、呼吸困難、黏膜破或疼痛)、腎功能異常症狀(排尿困難、血尿、尿量急劇改變)、泌尿道

感染(如血尿、排尿疼痛、發燒、骨盆疼痛或下腹疼痛)、生殖器感染(如陰道有滲出物或搔癢、陰莖/龜頭疼痛、腫脹、出疹或有滲出物)。

3. 本藥其他副作用包含：高血脂、口渴、噁心、尿量增加。當這些症狀嚴重或持續時，請就醫。

忘記服藥怎麼辦：

想起來的時候，儘快補吃，但若已接近下次服藥時間時，則不要補吃，只服用一次劑量即可，千萬不要服用雙倍的劑量。



藥品之儲存：

儲存 30°C以下，並放在孩童碰不到的地方。

其他：

1. 要定期回診，您的醫師可能會幫您做一些檢查，以確定您對本藥治療的反應。不要讓任何人服用你的藥物。
2. 本藥可能影響部分檢驗數值，應先告知醫師您有在使用本藥。

※若您有使用藥物之相關問題，請洽詢藥物諮詢專線詢問藥師或您的醫師。