

Digoxin 衛教單張

隆我心錠 Lanoxin[®] 0.25MG

主成分	含量	中文名	圖示
Digoxin	0.25MG	隆我心錠	

作用：Digoxin 為強心配醣體，可直接作用，增加心肌收縮性。用於心臟衰竭、心房撲動、心房纖維顫動、陣發性上室性心搏過速。

用法：請遵照醫師指示的用法及藥量使用。必須每日固定時間規律服用，未經醫師許可，千萬不可擅自停藥。

注意事項：

- 劑量過高或鉀離子偏低可能產生以下症狀，如噁心、嘔吐、腹瀉、全身疲倦、虛弱無力、食慾不佳、心跳太慢(每分鐘小於 55 下)等，請立即告知醫師。
- 平日可多補充富含鉀離子食物(如香蕉、柑橘、葡萄、海帶等)，應減少鹽類食物的攝取（燻肉、大量甘草、加工乳酪、醃製食物等）。
- 因為身體狀況會影響 Digoxin 的作用，請您將目前的身體狀況或病史告訴醫師，尤其是懷孕、授乳期、接受放射線治療或化學治療或心臟、腎臟、肺臟或甲狀腺等方面的疾病。

4. 有不少藥物會使 Digoxin 的作用減弱或增強，請您將目前正在服用的藥物告訴醫師。

副作用：(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。) 噁心，嘔吐，腹瀉，全身疲倦，虛弱無力，食慾不佳，心跳太慢，視覺不正常 (例如：看燈光會有閃爍感；對光敏感；看東西時，視覺大小與實體不符；視覺模糊；黃色或綠色異常；或看東西時有光暈)。

忘記服藥怎麼辦：忘記服藥時，請於想起時立即服藥，但若已接近下次服藥時間時，請直接服用下次之劑量，切勿一次服用兩次劑量。

如何儲存：請放置於陰涼或避免日光直射之處。