

陰道栓劑衛教單張

服樂淨栓劑 Frotin[®] supp、

洛黴欣陰道軟膠囊 Lomexin[®] supp

主成分	含量	中文名	圖示
Metronidazole	250mg	服樂淨栓劑	
Fenticonazole Nitrate	200mg	洛黴欣 陰道軟膠囊	

作用：陰道滴蟲感染所引起之陰道炎；生殖器念珠菌病(女陰與陰道炎、月經感染)。

用法：成人睡前使用一粒。

1. 施藥前先將患部清洗乾淨及乾燥。
2. 用肥皂及清水充分清潔雙手。
3. 打開栓劑外包裝。
4. 仰臥彎曲雙腿，輕輕將藥粒用手指推送入陰道深處 3-5 公分(約至食指第二節處)即可。

注意事項：

1. 本栓劑在夏天易產生溶化之現象，然栓劑之效果絕不致發生變化，栓劑

如軟化或溶化時，浸於冷水（20℃以下）即可凝固。

2. 月經期間仍要繼續用藥，不可擅自中斷。
3. 為避免小孩隨意取用，請放置於小孩不易取得之處。
4. 請依外包裝標示，於有效期限內使用完畢。

副作用：(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。) 有時有搔癢感、陰道壁充血和局部發紅等過敏症狀。

忘記使用怎麼辦：忘記使用時，請於想起時立即使用，但若已接近下次使用時間時，請直接使用下次之劑量，切勿一次使用兩次劑量。

如何儲存：請放置於陰涼或避免日光直射之處。

使用步驟(圖示)：

