

疥瘡藥品衛教單張

Miteout[®] Cream

主成分	含量	中文名	圖示
Permethrin	50mg/g , 30g	疥淨乳膏	

作用：治療疥瘡感染。

用法：先將患處以溫水洗淨，擦乾，以本品適量塗擦於頸部以下的皮膚(從脖子塗到腳底，且必須確認全身各處都有塗抹，包括背部、屁股縫、會陰部、肚臍、手指間、腳趾縫、指甲縫等)須經 8-12 小時後方可洗去。一週只抹一次。建議治療 2 週，並請於第三週回診。

注意事項：1.塗抹後 8-12 小時應徹底清洗全身 2.不得塗抹於破損的皮膚、黏膜或眼睛附近。3.熱水浴後不得立即使用。4.如果在塗抹後 8 小時內有洗手，請重新塗抹藥膏於手上。5.藥膏會完全滲入皮膚，因此不需要一直補擦到肉眼可見的程度。6.開始治療前 3 天及治療期間，患者的衣物及床被單等均須和他人分開清洗。

副作用：(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。) 皮膚不適、灼熱、刺痛或發麻

如何儲存：請放置於陰涼或避免日光直射之處，請勿冷藏，並置於小孩伸手不及處。開封後請於 15 天內使用完畢。