

使用Paxlovid用藥指導單張



一般劑量：一次一組，每組3顆



特殊劑量：一次一組，每組2顆

**早晚各吃一組，五天療程應按時規律服用完畢
需整粒吞服，不可壓碎、磨粉**

忘記服藥怎麼處理？(以下為舉例)



每一個人作息不一定，若有不清楚，請諮詢醫師或藥師

已知的可能副作用／注意事項與處理方式

立即通知醫師或藥師

食慾不振
皮膚和眼白變黃
深色尿液
淺色糞便
皮膚搔癢
胃部(腹部)疼痛

自主監測與管理

味覺改變→持續觀察
嘴巴苦→多喝水
高血壓→持續監測
腹瀉→持續觀察
肌肉痛→持續觀察

如果無法耐受
請聯絡醫師或藥師

服用其他藥物

此藥交互作用多，請完整與醫師、藥師討論您目前用藥（含中藥）。

絕對不可以併用(僅列常見)

前列腺藥：alfuzosin / 抗痛風：colchicine；
抗心律不整藥：amiodarone、dronedarone、propafenone、flecainide；
降血脂藥：lovastatin、simvastatin；
鎮定/安眠藥：triazolam、midazolam
抗癲癇藥：carbamazepine、phenobarbital、phenytoin；
麥角衍生物：dihydroergotamine、ergotamine；
胃腸藥：domperidone

此藥為緊急授權新藥，可能有未知副作用，如出現疑似副作用請立即與醫師、藥師聯絡

聯絡資料