

耐絞寧衛教單張

商品名	主成分	含量	中文名	圖示
Nitrostat SL	Nitroglycerin	0.6mg	耐絞寧 舌下含錠	

作用：有效緩解及預防因冠心病引起之心絞痛急性發作。

用法：當急性心絞痛發作時(胸悶、胸痛或胸部壓迫感，疼痛亦會轉移至頸部、下巴、左肩和左臂等)，採取坐姿服用，迅速將一粒耐絞寧置於舌下使其溶化吸收(切勿咬碎或整粒吞服)。在症狀緩解前，每隔 5 分鐘重複服用一粒。若在 15 分鐘內服用三粒後仍舊疼痛則應立即就醫。

注意事項：

1. 如果曾發生藥物過敏，請先告知醫師。
2. 孕婦、預備懷孕或授乳婦用藥前，請先告知醫師。
3. 請先告知醫師目前正在服用的其他藥品(包括指示用藥、成藥、中草藥或健康食品，尤其是其他降血壓藥及鎮靜劑)，以避免藥物交互作用。切勿自行購買藥物服用。
4. **耐絞寧舌下含錠**：瓶子開封後六個月，未使用的藥粒應丟棄(開封時可用奇異筆註記開封日期在瓶身上)。耐絞寧應置於原容器內(不可取出分裝)，並將瓶蓋蓋緊，儲存於乾燥室溫環境中，請放置於包包或隨手可拿取之處，勿放置於衣褲口袋裡。耐絞寧放久可能失效，請記得定期回診。

5. 請讓同住家人或親友知道藥品的位置。
6. 請隨時確認您手邊的藥量是否足夠。
7. 硝酸鹽類藥品請勿與威而鋼(Viagra)、樂威壯(Levitra)、犀利士(Cialis)等藥物併用。
8. 硝酸鹽類藥品均可能引起頭暈，如開車、操作機械時應小心。

副作用：(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。)

1. 若持續頭痛，請詢問醫師，勿擅自服用頭痛藥或增減藥品之劑量。
2. 若發生眩暈、虛弱、面潮紅、心跳快速、低血壓(收縮壓 < 90mmHg)，請立刻躺下或坐下，此症狀會在連續治療期間逐漸消失。
3. 可能發生噁心嘔吐、過敏皮疹，若症狀嚴重時，請與醫師聯絡。

忘記服藥怎麼辦：耐絞寧舌下含錠請隨身攜帶，需要時立即使用。

如何儲存：請放置於陰涼或避免日光直射之處。

使用步驟(圖示)：

