

點耳液衛教單張

Ofloxin[®] Otic Solution

主成分	含量	中文名	圖示
Ofloxacin	3mg/mL 5mL	耳普欣點耳液	

作用：成人及小兒外耳炎、成人及青少年鼓膜穿孔之慢性中耳炎，裝有鼓膜造口管的小兒急性中耳炎。

用法：成人通常每日給藥兩次，每次將 6 至 10 滴 耳普欣點耳液滴入耳中，藥水應停留在耳朵內 10 分鐘。劑量(使用次數)則可依據症狀之輕重予以調整。兒童的使用劑量需要減低。

1. 使用前用肥皂及清水充分清潔雙手。
2. 儘可能請他人幫忙給藥(避免自己投予時，藥口碰到耳壁污染)。
3. 若製劑是懸浮劑，使用前要搖勻。用乾淨紙擦淨瓶口前端。
4. 側面躺下或頭側傾，使須給藥的耳朵朝上。
5. 為了讓藥液流進去，成人要將耳朵往上後方拉，而小孩要往下後方拉。(使耳管變直)
6. 將藥液(1-2 滴) 滴在外耳道，不需太伸入。
7. 耳朵保持傾斜 2 分鐘，使藥液流入或用棉花輕塞入。

注意事項：不要讓水流入耳內，也不要用水清洗滴管。請用紙巾清潔滴管。

若給藥後耳道癢或有燒灼感，應立即讓醫師知道。不用時瓶蓋要緊閉。

副作用：(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。) 出現過敏症狀，應停止給藥。可能發生頭痛、點耳部位出現耳痛和外耳道發紅等。

忘記使用怎麼辦：忘記使用時，請於想起時立即使用，但若已接近下次使用時間時，請直接使用下次之劑量，切勿一次使用兩次劑量。

如何儲存：請放置於陰涼或避免日光直射之處。

