

藥品衛教單張



PAINKYL fentanyl ® buccal soluble films

主成分	含量	中文名	圖示
FENTANYL CITRATE	200 mcg	平舒疼 口頰溶片	

作用：癌症病人突發性疼痛之處置。

打開包裝：

1. 將鋁箔包的背面朝向自己，以剪刀沿著箭頭方向剪開。
2. 重複上述步驟剪開包裝另一側。



3. 將鋁箔包的兩層剝開，以清潔乾燥的手指取出口頰溶片(粉紅面朝上)。

用法：

		
用舌頭潤濕口腔兩頰內壁(要貼的地方)或用清水漱口。	將口頰溶片放在清潔乾燥的手指(靠近指尖處)，粉紅面朝上。	將口頰溶片粉紅面貼在口腔臉頰內壁，並按壓 5 秒鐘，使口頰溶片固定黏貼好，5 分鐘後才可以飲用液體。

注意事項：

1. 請勿咀嚼或吞服 Painkyl 口頰溶片；亦勿切割或撕裂口頰溶片。
2. 請於使用前一刻再拆開包裝。
3. 貼片溶散前（15～30 分鐘內），避免觸碰或移動貼片，並避免進食。
4. 勿同時使用超過四片 200 mcg Painkyl 口頰溶片；若使用多片口頰溶片時，可分別貼附於雙側之口腔黏膜，不應相互堆疊。
5. 若欲治療新一次的突發性疼痛，再次使用 Painkyl 口頰溶片需間隔至少 2 小時。
6. 使用 Painkyl 口頰溶片，請務必持續使用全天候類鴉片止痛藥。
7. 若一天使用超過四次 Painkyl 口頰溶片，請與您的醫師討論，可能需要調整類鴉片止痛藥之劑量。

副作用：噁心、嘔吐、頭暈、嗜睡、便秘、呼吸短促。

(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。)

藥品儲存：

1. 請保存於 20°-25°C，避免存放於高溫或潮濕處。
2. 請將藥品存放於兒童不易取得之處。