

藥品衛教單張

Qtern®

主成分	含量	中文名	圖示
Saxagliptin / Dapagliflozin	5/10mg	控糖穩膜衣錠	

作用：QTERN 是 saxagliptin 和 dapagliflozin 的固定劑量複方藥，適用於 18 歲和以上的成年第二型糖尿病病人：

- 當 metformin 和 QTERN 中之單一成分無法達到充分的血糖控制時，以改善血糖控制，
- 已使用 dapagliflozin 和 saxagliptin 的自由組合(free combination)治療時。

用法：

1. QTERN 的建議劑量為每日一次口服一錠 10 mg dapagliflozin/5 mg saxagliptin 錠劑，在早晨隨餐或空腹服用。
2. 請整錠吞服，請勿將 QTERN 錠劑壓碎、切開或咀嚼。

注意事項：

1. 若有腎功能不全、心衰竭、胰臟炎等病史等疾病，就診時請務必告知醫
國軍臺中總醫院藥劑科 關心您
藥物諮詢專線：04-23933786

師，由醫師評估是否可使用。

2. 此藥物不建議使用於第二、第三孕期婦女，若您計畫懷孕、已懷孕或正在哺乳，就診時請務必告知醫師，由醫師評估是否可使用。

使用禁忌：

對 dapagliflozin 或 saxagliptin 有嚴重過敏反應病史，包括急性過敏、血管性水腫或剝落性皮膚疾病。

- 中度至重度腎功能不全(eGFR 低於 45 mL/min/1.73 m²)、末期腎病(ESRD)或接受透析的病人。
- 對 dapagliflozin 或 saxagliptin 有禁忌者。

副作用：(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。)

副作用並不常見，但還是可能發生。如：生殖器黴菌感染、胰臟炎、急性腎損傷及腎功能不全、低血壓、排尿增加、酮酸中毒、關節疼痛等。

忘記服藥怎麼辦：

若您是規律性的服用此藥，則請於想起時立即服藥。但若已接近下次服藥時間時，請直接服用下次之劑量即可，切勿一次或短期間服用兩次劑量。



藥品之儲存：

1. 除非藥品另有標示使用期限外，一般效期為開方期限後三個月。
2. 藥品請置於室溫保存，避免存放於高溫或潮濕處。
3. 請將藥品存放於兒童不易取得之處所。

其他：

1. 要定期回診，您的醫師可能會幫您做一些檢查，以確定您對本藥治療的反應。不要讓任何人服用你的藥物。
2. 本藥可能影響部分檢驗數值，應先告知醫師您有在使用本藥。

※若您有使用藥物之相關問題，請洽詢藥物諮詢專線詢問藥師或您的醫師。

