

落建生髮慕絲衛教單張

落建生髮慕絲 Regaine 5%[®] Topical Aerosol Foam

主成分	含量	中文名	圖示
Minoxidil	50mg/ml	落建生髮慕絲	

作用：雄激素性禿髮。

用法：每天早晚各使用 1 次，每次 1g，因為生髮慕絲接觸到體溫後會迅速融化，建議使用前先用冷水沖手，降低手指溫度，再將手完全擦乾後，方可使用慕絲。垂直倒立瓶身，按壓噴頭將慕絲擠在手指上，塗抹的慕絲總量(1g)應為瓶蓋容量的一半(約等於一顆乒乓球大小)，將頭髮撥開使頭皮盡量露出，同時用另一隻手將泡沫塗抹於該區域的頭皮上。若使用時，慕絲沾到頭髮無須擔心，可以用指腹將頭髮上的慕絲按摩至頭皮上，讓頭皮吸收。

注意事項：

1. 生髮產品需持續使用數月方能顯現效果，請依照說明書按時使用。
2. 必須於使用 4 小時後，確定已被完全吸收後才可游泳或洗澡。

副作用：(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。) 輕微頭皮紅腫或刺痛感。

如何儲存：請放置於陰涼或避免日光直射之處。