

					
商品名	Saxenda®善纖達	Ozempic®胰妥讚	Trulicity®易週糖	Wegovy®週纖達	Mounjaro®猛健樂
成份	Liraglutide	Semaglutide	Dulaglutide	Semaglutide	Tirzepatide
通過美國 FDA 時間	2014	2017	2014	2021/6	2022
臺灣發證時間	2020/8/18	2019/6/24	2015/08/10	2023	2023
臺灣核准適應症	體重控制	第 2 型糖尿病控制 (減重目前為 Off-label use)	第 2 型糖尿病控制 (減重目前為 Off-label use)	體重控制	第 2 型糖尿病控制 體重控制
民眾自費價	3192 元/支	4215 元/支	1076 元/支	8160 元/1mg/dose、13200 元/1.7mg/dose	13125 元/支
包裝	3 支/盒	1 支/盒	2 支/盒	1 支/盒	1 支/盒
本院規格	18mg / 3ml / 支	4mg / 3ml / 支	1.5mg / 0.5ml / 支	4mg/3mL/支 (1mg/dose) 6.8mg/3mL/支 (1.7mg/dose)	10mg/0.6mL/dose (40mg/2.4mL/支)
劑量數	多次劑量 (可自行設定、調整)	4 次劑量	單次劑量	4 次劑量	多次劑量 (可自行設定、調整·但最多可按壓 12 次/支)
是否可調整注射量	是	否 (每次固定 1mg)	否 (每次固定 1.5mg)	否	是
「減重」用法	Week1→0.6mg QD Week2→1.2mg QD Week3→1.8mg QD Week4→2.4mg QD Week5 後→3mg QD	1mg QW (一支可打 4 次) (Off-label use)	1.5mg QW (一支只可打 1 次) (Off-label use)	第 1–4 週→0.25 mg QW 第 5–8 週→0.5 mg QW 第 9–12 週→1 mg QW 第 13–16 週→1.7 mg QW 維持劑量→2.4 mg QW	每週 2.5mg 起，並每四週增加 2.5mg，直到達到每週 15mg 為止
減重每月花費 (依民眾價)	第 1 個月→7448 元 之後每月→14896 元	每月 4215 元	每月 4304 元	每月 8160/13200 元	*估約 6562.5 元/月
研究呈現之減重效果	12 個月後體重下降平均約 7%	16 個月後體重下降平均約 15%	體重下降程度較 Ozempic 及 Saxenda 低	體重下降程度較 Saxenda 高，還可能帶來心血管保護作用	亞洲女性，使用一週一次的 tirzepatide 10mg (Mounjaro 10mg)，於 52 週後，平均可以減少約 13.6% 的體重，使用 tirzepatide 15mg (Mounjaro 15mg) 則可以減少 17.5% 的體重。
常見副作用	噁心、嘔吐、腹瀉、便秘	噁心、嘔吐、腹瀉、便秘	噁心、嘔吐、腹瀉、便秘	噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛	噁心、嘔吐、腹瀉、便秘
保存方法	未開封前：冷藏(2–8°C) 開始使用後：存放於 30°C 以下或冷藏	未開封前：冷藏(2–8°C) 開始使用後：存放於 30°C 以下或冷藏	未開封前：冷藏(2–8°C) 1 次即注射完 若置於 30°C 以下，最長可存放 14 日	未開封前：冷藏(2–8°C) 開始使用後：存放於 30°C 以下或冷藏	未開封前：冷藏(2–8°C) 開始使用後：存放於 30°C 以下或冷藏
保存期限	未開封：30 個月;使用後：1 個月	未開封：36 個月;使用後：6 周	依包裝	未開封：3 年;使用後：6 周	未開封：依包裝;使用後：1 個月
內附針頭與否	否，醫師需額外開立	是，盒內附有 4 個針頭	針頭已埋於筆型內部，注射時，按鈕後針頭自動彈出，完成注射	是，盒內附有 4 個針頭	否，醫師需額外開立
「T2DM」用法	無 T2DM 之適應症 (用於 T2DM 的為 Victoza®)	Month1→0.25mg QW Month2→0.5mg QW Month3 後→1mg QW (如果需要加強血糖控制)	初始劑量→0.75mgQW 更佳控制→1.50mgQW	無 T2DM 之適應症 (用於 T2DM 的為 Ozempic®)	初始劑量→2.5mgQW 使用初始劑量至少 4 週後，應以 2.5 mg 為單位逐次增加劑量。最大劑量為每週一次 15 mg 皮下注射。
廠商其他規格補充	- 諾和諾德	2mg/1.5ml/支 可調整注射 0.25mg 或 0.5mg 內附 6 個針頭 諾和諾德	0.75mg/0.5ml/支 一樣為單劑量 禮來	週纖達諾特筆(皆 4 次劑量) 0.25、0.5、1、1.7、2.4 mg 諾和諾德	多劑量 2.5 毫克/0.6 毫升、5 毫克/0.6 毫升、7.5 毫克/0.6 毫升、10 克/0.6 毫升、12.5 毫克/0.6 毫升、15 毫克/0.6 毫升 禮來