


Paxlovid (倍拉維) 腎功能不全患者之用法用量說明

腎功能不全		第1天	第2天	第3天	第4天	第5天		
輕度	無需調整劑量							早餐(第一天至第五天)
								晚餐(第一天至第五天)
中度	中度腎功能不全							早餐(第一天至第五天)
								晚餐(第一天至第五天)
重度 包括需要血液透析 的腎功能不全	重度腎功能不全 (一天服用一次, 劑量如下)							早餐 (第一天)
								晚餐 (第一天)
								早餐 (第二天至第五天)
								晚餐 (第二天至第五天)

- 重度腎功能不全應大約在每天同一時間施用，持續 5 天。
- 在血液透析的日子，應在血液透析後施用。

忘記服藥怎麼處理?(以下為舉例)



每一個人作息不一定，若有不清楚，請諮詢醫師或藥師

已知的可能副作用/注意事項與處理方式

立即通知醫師或藥師

食慾不振
皮膚和眼白變黃
深色尿液
淺色糞便
皮膚搔癢
胃部(腹部)疼痛

自主監測與管理

味覺改變→持續觀察
嘴巴苦→多喝水
高血壓→持續監測
腹瀉→持續觀察
肌肉痛→持續觀察

如果無法耐受
請聯絡醫師或藥師聯繫

服用其他藥物

此藥交互作用多，請完整與醫師、藥師討論您目前用藥(含中藥，如清冠一號)。

絕對不可以併用(僅列常見)

前列腺藥：alfuzosin
抗痛風：colchicine
抗心律不整藥：amiodarone、dronedarone、propafenone、flecainide；
降血脂藥：lovastatin、simvastatin；
鎮定/安眠藥：triazolam、midazolam
抗癲癇藥：carbamazepine、phenobarbital、phenytoin；
麥角衍生物：dihydroergotamine、ergotamine；
胃腸藥：domperidone

如出現疑似副作用請盡速與醫師藥師聯絡

