


肺樂喜易利達衛教單張

Trelegy Ellipta Inhalation Powder


主成分	含量	中文名	圖示
Fluticasone furoate 95mg/ Umeclidinium 55mg / Vilanterol 22mg	30 劑量塑膠殼 裝，含劑量計數之 吸入器	肺樂喜易利達 乾粉吸入劑	

作用：肺樂喜易利達適用於控制不佳的慢性阻塞性肺病(COPD)患者，治療氣道阻塞。


用法：應每天一次以經口吸入的方式投予 1 劑肺樂喜易利達。




步驟一：打開吸入器的吸口蓋。



步驟二：盡量呼氣。切勿將氣吹入吸口。



步驟三：吸入您的藥物。
以長而穩定的方式深吸一口氣。切勿讓您的手指擋住通氣孔。
將吸入器自您的口中移開。盡可能摒住這口氣，至少 3-4 秒(或在您舒適的前提下盡量摒住這口氣)。
慢慢輕輕地呼氣。



步驟四：關閉吸入器。



步驟五：漱洗口腔，並把水吐出。

副作用：(藥物副作用不一定發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。) 心悸、胸痛、心跳快速、顫抖或神經緊張。

忘記使用怎麼辦：想起來的時候，儘快補用。但若已接近下次用藥時間，則不要補用請跳過一次，下次用藥時依正常劑量使用，不要使用雙倍的劑量。

清潔方式：至少一星期清理吸入器一次。請以乾淨的酒精棉片或衛生紙擦拭吸嘴即可，不須以吹風機吹乾。藥罐請勿放入水中。

如何儲存：請勿存放於超過 30°C 的環境。如果是存放於冰箱中，使用前應放置至少 1 小時，使吸入器恢復至室溫。請存放於避免直接受熱或日照的乾燥處所。避免讓兒童取得。

肺樂喜易利達吸入器應存放於未開封的防潮鋁箔藥盒中，直到準備開始使用前才可將其自藥盒中取出。本吸入器不可重複使用。切勿試圖將吸入器拆開。

注意事項：

1. 如果您將吸口蓋打開再關上，但又未吸入藥物，您會浪費掉該劑藥物。
2. 每次使用完後需漱口，漱口能有效降低聲音嘶啞及鵝口瘡等副作用的發生。
3. 使用肺樂喜易利達的患者不可使用其他用於治療氣喘的 LABA 類藥物。
4. 為了避免復發不可在沒有醫師指導的情況下停止使用肺樂喜易利達。

重要事項：何時需要準備新的吸入器？

當您的吸入器只剩下小於 10 劑的劑量。劑量計數器的左邊會呈現紅色提醒您需要預約回診，準備新的吸入器。