

鼻噴劑衛教單張

特索寧 Trisonin[®] Aqueous Nasal Spray

主成分	含量	中文名	圖示
Triamcinolone Acetonide	0.55 μ g /每噴， 120 噴/瓶	特索寧水性鼻用 噴液劑	

作用：成人之季節性及經年過敏性鼻炎。

用法：成人及 12 歲以上之兒童：每日一次，每一鼻腔各噴兩下，一旦症狀控制時，可每一鼻腔各噴一下。6 至 12 歲之兒童：每日一次，每一鼻腔各噴一下。

注意事項：第一次用藥前，充分搖動藥瓶並對空噴壓藥劑至少 10 次，以確保噴出之藥量均一。此步驟可維持噴霧均一性約 72 小時，如果到下次使用前的時間超過 72 小時，使用前請再重覆上述對空噴壓動作，惟只需對空噴壓一次即可。若噴霧劑無法操作時，可能是因為噴嘴阻塞，請勿嘗試以針頭或其他尖銳物品將噴嘴口弄大，而破壞噴霧器的裝置。

副作用：(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。) 鼻癢，鼻內乾燥，打噴嚏等局部症狀發生，有時有輕微出血性分泌物。


忘記使用怎麼辦：忘記使用時，請於想起時立即使用，但若已接近下次使用時間時，請直接使用下次之劑量，切勿一次使用兩次劑量。

清潔方式：(1)將噴嘴朝下，以溫水沖洗噴嘴。(2)將水甩乾並以乾淨面紙擦拭。(3)重新試壓直至微細噴霧狀產生且可正常使用為止。

如何儲存：請放置於陰涼或避免日光直射之處。

操作步驟(圖示)：

使用說明

1 	使用前請先將本品充分搖勻，取下保護蓋，及安全鎖鑰(圖示)，輕擤鼻子，將鼻孔弄乾淨
2 	使用之操作是以拇指壓住瓶底，以食指和中指夾住瓶頸之環座，然後用指力壓下將來內懸液噴出
3 	如圖所示將本品之噴口放入一鼻孔中，以食指壓住另一鼻孔，按圖二所示之操作方法用指力壓噴出內懸液之同時緩緩深吸入，然後自口部慢慢呼氣。另一鼻孔照上述步驟使用之
4 	用畢後，清洗拭乾噴口，覆加保護蓋，並妥儲存