

藥品衛教單張

Xigduo® XR

主成分	含量	中文名	圖示
Dapagliflozin / metformin	10/1000 mg	釋多糖持續性藥效 膜衣錠	

作用：XIGDUO XR 結合了兩種作用機制互補的降血糖藥，改善第二型糖尿病患者的血糖控制。

用法：

1. 本藥通常每日服用一次，請依照醫師指示服用。本藥需規律服用，除非產生嚴重低血糖，否則不應自行停藥。
2. 本藥應整粒吞服，勿磨碎或咬碎。服用本藥後，可能會有水狀類似原本錠劑的物質從糞便排出，此為正常現象。

注意事項：

1. 在服用此藥前，請告訴醫師或藥師，您是否對任何藥物有過敏反應。
2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物(尤其是其他治療糖尿病的藥品)及病史(特別是腎臟疾病、肝臟疾病、胰臟炎病史與泌尿道感染)。

3. 若您在服用本藥期間，需要進行注射顯影劑之影像檢查，請事前告知醫師您有在服用本藥。
4. 為使糖尿病受到良好控制，請遵醫囑控制飲食、飲酒量、檢查血糖、糖化血色素及尿糖，運動應規律。
5. 應適時補充水分及維持個人衛生，以預防體液流失造成的低血壓和泌尿道感染。
6. 服用本藥期間若要進行手術，應先告知醫師、牙醫師。
7. 本藥可能會導致泌尿道感染與生殖器感染。泌尿道感染的症狀包含血尿、排尿疼痛、發燒、骨盆疼痛或下腹疼痛。女性生殖器感染的症狀包含陰道有滲出物或搔癢；男性生殖器感染包含陰莖/龜頭疼痛、腫脹、出疹或有滲出物。當出現相關症狀時，應就醫。
8. 由於本藥含 metformin 成份，長期服用本藥可能導致維生素 B12 缺乏。

孕婦用藥等級及注意事項：

不建議在懷孕期間，尤其是在第二孕期和第三孕期時使用本藥。

計畫懷孕注意事項：

如妳計畫準備懷孕，或在服藥期間已懷孕，就診時請務必告知醫師。

嬰兒餵母乳時注意事項：

不建議在哺乳期間使用。

飲食注意事項：

1. 遵照醫師或營養師的運動和膳食建議，食用健康的膳食。
2. 服藥期間避免飲酒。


 **副作用：**(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。)

1. 本藥品和其他降血糖藥品，如 sulfonylurea 類降血糖藥與胰島素，可能會產生低血糖。當發生嚴重低血糖時，如痙攣、昏迷，不可進食，立即送急診。若有其他低血糖症狀(虛弱、昏昏欲睡、昏亂、突然很餓、冒冷汗、顫抖、視力模糊、心悸、頭痛等)，立即進食含有糖的食物或飲料(如糖果或果汁)，若未改善，則應送急診。
2. 本藥含有 metformin 成份，在罕見的情況下可能引發乳酸中毒，進而引發低血壓、失溫與心律不整。乳酸中毒的症狀較不具特異性，包含疲勞、肌肉痛、呼吸困難、腹痛、嗜睡，並伴隨血中乳酸濃度升高與酸血症。一般情況下，這項副作用不常發生，但在肝腎功能不全、老人、暴露顯影劑、缺氧狀態(如急性心衰竭)等情形下發生機率較高。
3. 若出現以下情形請立即就醫：若出現過敏反應(如紅疹、蕁麻疹、臉部/嘴唇/喉部腫脹、呼吸困難、黏膜破或疼痛)、腎功能異常症狀(排尿困難、血尿、尿量急劇改變)、泌尿道感染(如血尿、排尿疼痛、發燒、骨盆疼痛或下腹疼痛)、生殖器感染(如陰道有滲出物或搔癢、陰莖/龜頭疼痛、腫脹、出疹或有滲出物)、乳酸中毒症狀。
4. 本藥其他副作用包含：高血脂、口渴、噁心、尿量增加、腸胃道不適症

狀(如腹瀉、噁心、嘔吐、脹氣、腹痛)、頭痛、肌肉痛、頭暈。當這些症狀嚴重或持續時，請就醫。

✚ 忘記服藥怎麼辦：

想起來的時候，儘快補吃，但若已接近下次服藥時間時，則不要補吃，只服用一次劑量即可，千萬不要服用雙倍的劑量。



✚ 藥品之儲存：

儲存 30°C以下，並放在孩童碰不到的地方。

✚ 其他：

1. 要定期回診，您的醫師可能會幫您做一些檢查，以確定您對本藥治療的反應。不要讓任何人服用你的藥物。
2. 本藥可能影響部分檢驗數值，應先告知醫師您有在使用本藥。

※若您有使用藥物之相關問題，請洽詢藥物諮詢專線詢問藥師或您的醫師。