

國軍臺中總醫院-自費疫苗品項表 更新：2025.11.27

項次	品名	圖片	疫苗活性	用途	價格	年齡等備註	施打方式
1	ENERGIX-B 安在時B肝疫苗 20mcg/1mL (院內碼R10H213)		不活化	預防B型肝炎	357	成人使用1 vial， 投與三劑 ：採用第0、1、6個月各施打一劑。 兒童(10歲以上) 使用1 vial， 投與兩劑 ：第0、6個月各施打一劑(在這種情況下可能要接種第二劑之後才能達到預防B型肝炎的效果)	1. 肌肉注射 於手臂三角肌部位，不可採臀部注射或皮內注射。 2. 使用前應 充分搖勻 ，使其略呈不透明白色懸浮液。
2	Gardasil 9 9價人類乳突病毒疫苗 (院內碼RIGARDI)		不活化	9-45歲男性與女性之預防接種 (預防之內容參仿單)	5,850	0、2個月、6個月 各施打一劑0.5毫升的劑量	1. 肌肉注射 ，施打於上臂的三角肌區域，或是大腿前外側。 2. 本包裝含針頭，使用前請 充分搖勻 後為白色的混濁液體，以 順時鐘 方向旋轉的方式安裝針頭。
3	PNEUMOVAX 23 紐蒙肺多價性肺炎鏈球菌23價 (院內碼R10P329)		不活化	預防肺炎雙球菌性肺炎及菌血症	1,361	一年後建議施打13價肺炎疫苗或五年後考慮再補打23價疫苗。	皮下或肌肉注射。 預充疫苗針筒，為一澄清、無色之液體。
4	Prevenar 13 沛兒肺炎鏈球菌疫苗13價 (院內碼R1P3EVN)		不活化	出生 2 個月以上主動免疫接種	3,751	接種單一劑量 0.5 mL 即可，效力至少 5年 以上。	1. 肌肉注射 ，嬰兒之大腿前外側的股外側肌，或是幼童及成人之上臂的三角肌。 2. 注射針筒排氣前，請先 振搖 使藥液呈白色均勻懸浮液。
5	ROTARIX 羅特律輪狀病毒疫苗口服懸液劑 (院內碼ROROTAR)		活化	預防輪狀病毒所引起的腸胃炎	2,115	完整疫苗接種共 兩劑 ，最好在出生後6至16週接種，必須在出生後24週內完成。兩劑間隔不少於4週。	僅供 口服 。 泡製流程請看仿單，泡製後的疫苗看起來混濁為正常。
6	TETANUS TOXOID 破傷風類毒素 0.5mL (院內碼R1TETAT)		不活化	預防破傷風	123	作用持續時間可達 5至10年 。	1. 肌肉注射 。 2. 使用前請 搖勻 ，外觀為灰白色懸浮液。
7	VERORAB 巴斯德狂犬病疫苗 (院內碼R1VEROR)		不活化	預防狂犬病	1,418	暴露前（出發前一個月） ：當日、第7日及第28日(或第21日)接種3劑。 暴露後（曾接種過） ：受傷時接種第一劑，3天後接種第二劑即可。 暴露後（未曾接種過） ：當日、第3日、第7日、第14日及第28日並且注射狂犬病免疫球蛋白。	肌肉注射(須混合稀釋液) <u>混合前，粉末呈均勻白色，溶劑為澄清、無色溶液。</u> 1. 取下凍晶粉末玻璃小瓶的瓶蓋。 2. 將柱塞桿旋入注射器內，若兩者為分開提供。 3. 將溶劑注入裝有凍晶粉末之玻璃小瓶中 4. 輕輕振搖玻璃小瓶，直到粉末的懸浮液均勻為止。 5. 混合配製後的疫苗應為澄清、均勻且無顆粒。 6. 取下並丟棄用於配製疫苗的注射器。 7. 使用一支套上新針頭的新注射器抽出配製後疫苗。 8. 以一支新的針頭更換抽取疫苗的針頭，用於肌肉注射。
8	Shingrix 欣克疹重組帶狀疱疹疫苗 (院內碼R1SHING)		不活化	預防成人帶狀疱疹： 50歲以上或18歲以上且有危險因子(免疫功能不全或疾病)者	9,223	1. 完整疫苗接種共 兩劑 ，每劑0.5mL 2. 第二劑於第一劑施打 2 至 6 個月後施打，至少 4年 保護效果。 3. 兩劑間隔不少於4週。	肌肉注射(須混合稀釋液) <u>混合前，粉末為白色，懸液為帶有乳白色光澤、無色至淡棕色液體。</u> 1. 將裝有懸液之小瓶中的全部內容物抽入針筒。 2. 將針筒中的全部內容物加入裝有粉末的小瓶中。 3. 輕輕振搖，直到粉末完全溶解。泡製後的疫苗為帶有乳白色光澤、無色至淡棕色的液體。 4. 如未在6小時內使用，應予以丟棄。
9	Varivax 伏痘敏活性水痘疫苗 (院內碼R1VARIA)		活化	水痘之主動免疫，用於預防12個月大以上之水痘感染	2,500	1. 12個月大至12歲的兒童 ，若施打第二劑時，兩劑之間應間隔至少3個月。 2. 13歲以上的青少年及成人 ，須施打兩劑。兩劑之間應間隔4到8週。 3. 每次皮下注射劑量為0.5ml	皮下、肌肉注射(須混合稀釋液，不可直接注射於血管內) <u>凍晶乾燥、白色、緻密結晶顆粒。</u> 1. 先用針筒吸取0.7mL的稀釋液，注入冷凍乾燥疫苗中。 2. 搖晃使之混合完全後為透明或略帶淡黃色的澄清液體。 3. 全部注射於肌肉或皮下(大約0.5mL)，最適合注射的部位在上臂三角肌外側、或大腿前外側。 4. 混合後30分鐘內沒有使用的疫苗應予以丟棄。
10	EnVAX-A71 腸病毒疫苗 (院內碼R1ENVAX)		不活化	適用於 2 個月以上至未滿 6 歲嬰幼兒的主動免疫接種，以預防腸病毒 71 型感染所引起之疾病。	3,750	1. 適用於2個月以上至6歲 2. 共需施打2劑 ，間隔28天 3. 每劑 0.5 mL	1. 肌肉注射 ，預充注射針筒包裝，注射於手臂，嬰幼兒則注射於大腿前外側。 2. 靜置時外觀為無色液體，搖勻後為混濁白色懸浮液。 3. 使用前應先將疫苗 回溫至室溫 ，使用前請先 搖勻 。
11	Adacel 安打星三合一補追疫苗 (院內碼R1ADACL)		不活化	適用於4歲以上之追加疫苗接種，以預防白喉、破傷風、百日咳。	1,411	1. 一次注射一劑（0.5毫升） 2. 懷孕期間的母體接種可提供嬰兒早期的百日咳被動保護作用	1. 肌肉注射 ，三角肌為較佳的注射部位 2. 應充分 搖晃 直到形成均勻、混濁的懸浮液為止。
12	M-M-R 麻疹、腮腺炎及德國麻疹三種混合疫苗 (院內碼R1MMRII)		活化	預防麻疹、腮腺炎及德國麻疹。	746	1. 適用於12個月大或12個月大以上的人 2. 混合稀釋液，注射劑量大約為0.5毫升 3. 接種對象參考疾管署「國內現行麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）預防接種建議」	肌肉或皮下注射(須混合稀釋液) 凍晶乾燥略成黃色晶體狀。 1. 將注射器中所有稀釋液注入含有凍晶乾燥疫苗之小瓶。 2. 輕輕 搖動 使之完全混合，稀釋後呈澄清黃色。 3. 假如此凍晶疫苗無法全部溶解，此瓶疫苗應棄置不用。

113.01.31修正歲數及性別
114.01 更換代碼

114.01 更換代碼

114.01 更新價格

114.01 更新價格

114.01.16 補充細節
114.06.07 更新價格

114.01 更新價格

114.01 新增

114.01 新增
114.06 更新價格

Zostavax 伏帶疹活性帶狀疱疹疫苗 (院內碼R1ZOSTA)		活化	預防50-79歲之成人帶狀疱疹（皮蛇）	6, 250	單一劑量0.65mL 皮下注射 ，可提高水痘帶狀疱疹病毒特异性免疫力，至少 4年 保護效果。	113.01.31修正價格 114.01 已停產
---	---	----	---------------------	--------	--	-----------------------------