



抑凝安衛教單張

商品名	主成分	含量	中文名	圖示
Efient	Prasugrel	3.75 mg/ tab	抑凝安	 3.75 mg
		5 mg/ tab		 5 mg

作用：抗血小板藥物，預防血栓形成。需要冠狀動脈介入性治療(PCI)的急性冠狀動脈症候群。

用法：起始劑量為單次口服使用 20 mg，維持劑量為每日一次 3.75 mg，除起始劑量外，不建議空腹服用。

注意事項：

1. 請遵從醫師指示服藥。請勿自行停用藥物或隨意增減劑量，可能增加血栓形成或出血的風險。
2. 對本藥及藥物內所含的賦型劑過敏者，請告知您的醫師及藥師。
3. 本藥會延長出血時間，使用期間請避免碰撞或受傷。建議選擇軟毛牙刷，若發生口腔出血可以冰水漱口；男士請用電動刮鬍刀刮鬍子，如有不慎造成外傷出血情形，請局部加壓 10~15 分鐘止血。

4. 如計劃手術或拔牙，請詢問醫師是否需暫時停藥及再次用藥的時間。
5. 計畫懷孕、孕期或哺乳期間不建議使用，請事前與醫師討論。
6. 除非有醫師指示，否則應避免與會增加出血風險的藥物併用（如 NSAIDs、抗凝血劑、中草藥等）。
7. 若出現皮膚紫斑、眼睛泛黃、尿液顏色變深、單側無力或說話困難等異常，請立即就醫。

副作用：(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。)

1. 出血相關：皮下出血、沒有碰撞但出現大片瘀青、流鼻血、血尿、血便、黑便、經血量異常等，請依嚴重程度回診就醫。
2. 其他：皮疹、高血壓、頭痛、頭暈、噁心、疲倦、水腫、背痛等。

忘記服藥怎麼辦：

1. 發現時距離原服藥時間在 12 小時內，可補吃當次劑量。
2. 若已超過 12 小時，則略過不要服用，待下次服藥時間吃當次劑量，請勿一次服用雙倍劑量。

如何儲存：藥品請置於室溫保存，避免存放於高溫或潮濕處。請將藥品存放於兒童不易取得之處所。