

艾必克凝衛教單張

商品名	主成分	含量	中文名	圖示
Eliquis	Apixaban	5 mg	艾必克凝	

作用：抗凝血劑，防止血栓形成。

1. 成人非瓣膜性心房纖維顫動病患且有以下至少一項危險因子*者預防發生中風與全身性栓塞。

*危險因子包括：(1)曾發生腦中風或短暫性腦缺血發作(transient ischemic attack)，(2)年齡大於或等於 75 歲，(3)高血壓，(4)糖尿病，及(5)有症狀之心衰竭 (NYHA Class $\geq$ II)。

2. 在成人中治療深靜脈血栓(DVT)與肺栓塞(PE)，以及預防深層靜脈血栓與肺栓塞復發。

用法：每次口服半顆或一顆，一天兩次，空腹或飯後服用均可，請每天固定時間遵循醫師指示服藥。

注意事項：

1. 若對本藥過敏，請告知醫師及藥師。
2. 未經醫師指示，請勿擅自更改劑量或停藥。
3. 接受任何手術或拔牙前，請告知醫師或牙醫師正在服用本藥。
4. 某些藥物會與 Eliquis 產生交互作用，若有同時服用其他藥物、中草藥、健康食品等請告知醫師、藥師。

5. 無法吞服整顆錠劑的病人，可將錠劑壓碎放入水中，即可經由鼻胃管投予。
6. 若發生不尋常的出血或瘀青，請立即就醫。
7. 請避免受傷，建議使用軟毛牙刷及電動刮鬍刀。

副作用：(藥物副作用不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。)

1. 可能出現流鼻血、牙齦出血、皮下瘀青、頭暈、頭痛、疲倦感、腸胃不適(如噁心、嘔吐、腹痛、便秘或腹瀉)等。
2. 異常出血：若出現不尋常的出血或瘀青、血尿、咳血、大量出血等情況，請立即就醫。
3. 過敏反應：皮膚紅癢、嘴唇腫脹、胸悶、呼吸困難等。

忘記服藥怎麼辦：

1. 若漏服一劑，應於當天盡快補服，但若距離下次服藥時間不足 6 小時則跳過，不可加倍服藥。

1 圖解判斷法則



⚠ 絕對禁止服用雙倍劑量：若跳過一次，下次只需服用原本的一顆，切勿為了補償而吃兩顆。

如何儲存：藥品請置於室溫保存，避免存放於高溫或潮濕處，並存放於兒童不易取得之處。