

里先安衛教單張

商品名	主成分	含量	中文名	圖示
Lixiana	Edoxaban	30mg/tab 60mg/tab	里先安	 30 mg (標記 DSG/L30) 60 mg (標記 DSG/L60)

作用：抗凝血劑，防止血栓形成。預防非瓣膜性心房纖維顫動(NVAF)合併以下至少一項危險因子之病患發生中風及全身性栓塞。

* 危險因子：鬱血性心臟衰竭、高血壓、年齡 ≥ 75 歲、糖尿病、曾發生中風或暫時性腦缺血(TIA)。

用法：請遵從醫師指示服用。通常每次口服半顆或一顆，一天 1 次，空腹或飯後服用均可。

注意事項：

1. 如無法整錠吞服，可將藥錠磨粉泡水、管灌使用。
2. 未經醫師指示，請勿擅自更改劑量或停藥。
3. 請定期回診並追蹤檢驗數值以確保藥物療效。
4. 請讓所有照顧您的醫療人員都知道您正在服用此藥。
5. 若近期內預計會接受手術、拔牙，請詢問您的醫師是否需暫時停藥以及後續再次服藥的時機點。

6. 重度肝腎功能不佳時，會影響到藥物之效果，請主動告知醫師。
7. 若為計劃懷孕之女性、孕婦或哺乳媽媽，用藥前請記得提醒醫師。
8. 請避免從事可能讓您受傷的活動或激烈運動，建議使用軟毛牙刷或電動刮鬍刀。
9. 請不要自行服用任何藥物、保健食品或中草藥等，請事先詢問醫師。

副作用：(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。)

1. 出血相關：貧血、皮膚軟組織出血(如瘀青、紫斑)、刷牙時牙齦出血、咳血或吐出看似像咖啡渣的物質、血尿、血便、黑便等，若情形嚴重，請迅速就醫。
2. 其他常見不良反應：過敏、皮疹以及肝功能檢驗值異常等。

忘記服藥怎麼辦：

1. 發現時距離原服藥時間在 12 小時內，可補吃當次劑量。
2. 若已超過 12 小時，則跳過不要服用，待下次服藥時間吃當次劑量，切勿一次服用雙倍劑量。

如何儲存：

1. 存放於室溫下、乾燥的密閉容器內。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 請勿將您的藥物提供給他人使用。