

普栓達衛教單張

商品名	主成分	含量	中文名	圖示
Pradaxa	Dabigatran etexilate	110 mg/cap 150mg/cap	普栓達	 110 mg 150 mg

作用：抗凝血劑，防止血栓形成。預防非瓣膜性心房纖維顫動病患發生中風與全身性栓塞。

用法：每次口服一顆，一天 2 次，空腹或飯後服用均可。

注意事項：

1. 請將膠囊整顆吞服，切勿打開膠囊，弄破、咀嚼或取出膠囊內藥粒均可能導致藥物暴露量增加，本藥不可管灌、磨粉使用。
2. 未經醫師指示，切勿擅自更改劑量、停藥或自行服用其他藥物、保健食品或中草藥等。
3. 請遵循醫師指示，定期回診並追蹤檢驗數值。
4. 請讓所有照顧您的醫療人員都知道您正在服用此藥。

5. 計畫懷孕、孕婦、哺乳者，用藥前請提醒醫師。
6. 若需接受手術或拔牙，請詢問您的醫師是否需暫時停藥，以及停藥後再次服藥的時間點。
7. 避免從事可能受傷的活動或行為，建議選擇軟毛牙刷或電動刮鬍刀。

副作用： (藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。)

1. 過敏反應：皮疹、皮膚紅癢或脫皮；臉部、嘴部或喉嚨腫脹、難以呼吸、吞嚥或說話困難等。
2. 容易出血：流鼻血、牙齦出血、紅色或暗褐色尿、咳血、血便或黑便、皮膚容易挫傷、瘀青、傷口流血不止、頭痛、暈眩或虛弱、月經流量增加或陰道出血等。

忘記服藥怎麼辦：

1. 若漏服一劑，應於當天盡快補服，但若距離下次服藥時間不足 6 小時則跳過，不可加倍服藥。



如何儲存：以原包裝於室溫下保存。避免放在孩童容易取得的地方。