

拜瑞妥衛教單張

商品名	主成分	含量	中文名	圖示
Xarelto	Rivaroxaban	10 mg/ tab	拜瑞妥	

作用：抗凝血藥物，避免血栓形成。用於非瓣膜性心房顫動且有危險因子之病人，預防中風及全身性栓塞。於靜脈血栓高危險群（曾發生有症狀之靜脈血栓症）病患，以預防其於接受下肢重大骨科手術後之靜脈血栓栓塞症(VTE)。

用法：請遵循醫囑服藥，通常一日服用一次，每日最大劑量為 20 mg。

注意事項：

1. 於每日固定時間服用適當劑量，且不可自行改變劑量或停藥。
2. 若無法吞嚥，可將膜衣錠壓碎混入水中喝下，亦可透過鼻胃管給藥。
3. 計劃懷孕、懷孕或哺乳應先告訴醫師。
4. 請確實告知醫師是否曾有出血（不正常瘀血、流鼻血或經期過長）、肝腎疾病、藥物過敏等問題。
5. 請勿自行併用其他會影響凝血功能的藥物，如：阿斯匹林、NSAIDs、中草藥等。
6. 如要進行手術、牙科處置或侵入性處置等，請記得詢問醫師是否需事先停藥及再次開始用藥的時機。

7. 減少可能造成碰撞或受傷的活動，避免出血發生，建議使用軟毛牙刷及電動刮鬍刀。

副作用：(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。)

1. 血液相關：術後出血、貧血、傷口持續流血不止、經血量異常、皮下出血、異常瘀青、斑塊、血尿、血便、黑便、刷牙時牙齦出血等。
2. 其他：過敏反應 (如搔癢、紅疹)、噁心、頭暈、頭痛等。
3. 嚴重、不尋常的瘀血、出血、血尿、血便、發燒或過敏等，應立即就診並告知醫師。

忘記服藥怎麼辦：如果在預計服藥時間未服用本品，則於同一天內儘速服用，並於隔日依原定時間服用一次。請勿於同一天內服用加倍劑量。

如何儲存：

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 請勿將您的藥物提供給他人使用。