


Vimax[®] Foaming Solution 衛教單張

主成分	含量	中文名	圖示
Clobetasol 0.05%	25ml/瓶	可易適泡沫液	

作用：為強效類固醇消炎止癢藥，可用於治療牛皮癬、濕疹、扁平苔癬、盤狀紅斑性狼瘡及其他對溫和類固醇無理想反應的皮膚病灶。

用法：

1. **搖勻：** 使用前請先握緊瓶身搖動數次，使裡面的液體及氣體充分混合。
2. **擠出：** 請握住鋁罐，垂直倒立 90 度，將泡沫擠在瓶蓋內（勿直接噴於患部，以免體溫使泡沫溶化為水狀，導致藥物過量）。
3. **塗抹：** 以手指挖取適量泡沫，輕擦於患部並適度按摩。
4. **頻率：** 每日 1-2 次，情況改善後即應停止用藥。



注意事項：

- **治療期限：** 盡量避免長期持續治療。**治療超過四周**若未複診，請停止治療。若用於孩童，建議每週複診。
- **正確保存：**藥品請放置 25 度以下陰涼處儲存，不可長期放在冰箱，低溫會使內容物油水分離並堵塞噴嘴。
- **避免誤觸：** 塗敷眼皮時應小心，避免藥物進入眼睛（可能造成青光眼）。
- **衛生習慣：** 塗抹後請清洗雙手。未用完的泡沫建議丟棄，患部塗抹後不須額外沖洗。

副作用：皮膚變薄、出現萎縮紋、多毛症或局部刺激感 (藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡)。

忘記服藥怎麼辦：

想起時應儘快補用。若已經接近下次用藥時間，請跳過一次，於下次用藥時間依正常劑量使用即可，切勿同時使用兩倍劑量。

清潔方式：噴嘴若有殘留泡沫，可用乾淨紙巾擦拭。保持噴嘴通暢。

剩餘量觀測方式：當內容物快用完時，擠出的泡沫液可能會呈現較稀薄的狀態，此時請確認是否已無足夠泡沫擠出，並評估是否需要複診開立新藥。

操作步驟(圖示)：

正確操作：請勿將噴嘴朝上、斜角朝上、水平擠壓或斜角朝下，以免瓶內推進氣體外洩，導致後續無法擠出泡沫。

