



祛膚敏乳膏 “溫士頓”

CHU-FU CREAM "WINSTON"

衛署藥製字 第 043003 號

須由醫師處方使用

版本日期 2022-11-01

1 性狀

1.1 有效成分及含量

Each gram contains :

Betamethasone (as Dipropionate)..... 0.5 mg

Clotrimazole..... 10 mg

Gentamicin (as Sulfate).....1 mg(potency)

1.2 賦形劑

Liquid Paraffin、Cetomacrogol、Tween 60、Stearyl Alcohol、Propylene Glycol、Paraffin Wax、Sorbitan Monostearate、White Petrolatum、Polyethylene Glycol 400、Aloe Vera Gel、Fragrance、Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate、Purified Water

1.3 劑型

乳膏劑。

1.4 藥品外觀

白色均勻乳膏。

2 適應症

過敏性皮膚病和細菌或黴菌所引起的皮膚感染症。

3 用法及用量

3.1 用法用量

每日兩次均勻塗抹於患處皮膚表面，治療時間長短不一，以黴菌感染為例：足癬可能需治療 2-4 星期。

4 禁忌

- (1) 結核菌皮膚感染。
- (2) 急性單純疱疹。
- (3) 局部病毒感染。
- (4) 牛痘及水痘。
- (5) 對本藥成分具過敏反應者。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

- (1) 本藥應用於大面積皮膚的塗抹或使用於封閉敷料時，所含主成分之一的 Betamethasone

Dipropionate，如同其他皮質類固醇一般，可能經由皮膚吸收而形成全身性的作用。

(2) 本藥不可用於眼睛。

(3) 長期連續或不當使用局部皮質類固醇類藥品會導致停止治療後出現反彈性發作(局部類固醇戒斷反應)。嚴重反彈性發作範圍可能超出初始治療部位，其症狀可能以皮炎伴有強烈發紅、刺痛和灼熱感，特別使用於臉部和彎曲區域等較為嬌嫩皮膚部位時更容易發生。如果在治療成功後數天至數週內再次出現上述症狀，應懷疑可能為反彈性發作。另如需重新使用局部皮質類固醇類藥品，請謹慎評估其臨床效益與風險，或考慮改以其他治療方案替代。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

懷孕三個月內的孕婦使用本藥時應小心注意。

7 交互作用

目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

皮膚和皮下組織疾病 - 戒斷反應(頻率未知)：皮膚發紅，可能會蔓延超出初始治療區域，灼熱或刺痛感，搔癢，皮膚脫屑，滲膿。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

(1) Clotrimazole：具廣效抗真菌作用，可穿透真菌細胞壁之幾丁質(Chitin) 增加真菌細胞內各胞器之膜通透性，而造成內容物的外流，導致真菌死亡。

(2) Betamethasone Dipropionate：具有消炎、止癢和血管收縮作用。

10.2 藥效藥理特性

(1) Betamethasone Dipropionate，它是一種皮質類固醇，具有抑制發炎、抗過敏及止癢的療效。

(2) Clotrimazole 是一種廣效性抗黴菌劑，包括：皮癬菌、酵母菌及黴菌引起感染均療效。

(3) Gentamicin Sulfate 對革蘭氏陽性、陰性細菌均有效，可治療因細菌感染而引起的皮膚病。因此本品對於許多不同類型、難治的皮膚感染疾病均有療效。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

100 公克以下塑膠軟管裝、鋁管裝、塑膠罐裝、積層鋁塑軟管裝。450 公克及 1000 公克塑膠瓶裝。

13.2 效期

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

25°C 以下緊密容器貯存。

製造廠

溫士頓醫藥股份有限公司

台南市永康區鹽洲里仁愛街 1 1 7 號

藥商

溫士頓醫藥股份有限公司

台南市永康區鹽洲里仁愛街 1 1 7 號