



富帝芬貼片

FLUR DI FEN PATCH

衛署藥製字 第 040358 號

須由醫師處方使用

版本日期 2024-08-28

1 性狀

1.1 有效成分及含量

Each gm contains : Flurbiprofen 3.33 mg。

1.2 賦形劑

Purified Water, Glycerin, PVA Solution, Sorbitol Solution, Sodium Polyacrylate, Nikasol TS-620, Kaolin, Carboxymethylcellulose Sodium, Sodium Polyacrylate Starch, Alcohol, L-Menthol, Tween 80, Nonion OP-80R, Titanium Dioxide, Tartaric Acid, Isopropyl Myristate, Aerosil 200

含蘆薈萃取物:

Purified Water, Glycerin, PVA Solution, Sorbitol Solution, Sodium Polyacrylate, Nikasol TS-620, Kaolin, Carboxymethylcellulose Sodium, Sodium Polyacrylate Starch, Alcohol, L-Menthol, Tween 80, Nonion OP-80R, Titanium Dioxide, Tartaric Acid, Isopropyl Myristate, Aerosil 200, Aloe Extract

1.3 劑型


貼片劑。


1.4 藥品外觀

富帝芬貼片為一長方形之貼片，具三層結構。

含藥層為白色膏體均勻塗布於不織布聚酯(non-woven polyester)的背襯上，膏面以聚丙烯(polypropylene)薄膜(離形紙)覆蓋。使用前要先將離形紙撕下。詳見圖1。

圖1：結構示意圖





2 適應症

變形性關節症、肩關節周圍炎、肌腱腱鞘炎、腱周圍炎、上腕骨上髁炎、筋肉痛、外傷之腫脹疼痛等上述疾患及症狀之鎮痛消炎。

3 用法及用量

3.1 用法用量

- 通常一日二次貼於患部，依患部情況給予適當增減使用，切割成適當大小，剝去表面薄紙，貼於患者使用(本品取下時不會有疼痛感)。
- 患部有濕汗或污垢時會減少膏面之粘著，貼用前請先將患處清洗並拭乾以增強粘著性及藥效。
- 於關節等易脫落之部位，可用粘著性膠帶或伸縮繃帶固定。

4 禁忌

目前尚無資訊。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

- 請勿使用於眼睛四週、粘膜、濕疹、傷口。
- 曾對藥物或化粧品等有過敏症狀者(例如：發疹、潮紅、搔癢、搔疹等)，使用前需請教醫師或藥師。
- 兒童須在保護者指導監督下，才可使用。
- 2歲以下兒童之使用須詢問醫師或藥師。
- 懷孕30週以上之孕婦使用非類固醇抗發炎藥(NSAIDs)可能導致胎兒心臟導管過早閉合和肺動脈高壓，應避免使用。懷孕20週或以上之孕婦使用非類固醇抗發炎藥(NSAIDs)可能導致胎兒腎臟功能不全(fetal renal dysfunction)、羊水過少(oligohydramnios)，甚至新生兒腎臟損傷(renal impairment)。若醫療專業人員認為病人有必要於孕期20至30週時使用非類固醇抗發炎藥，則應限制以最低有效劑量及最短期間治療。若治療時間超過48小時，醫療專業人員應考慮使用超音波監測羊水狀態。

6 特殊族群注意事項


6.1 懷孕

抑制前列腺素合成可能會影響懷孕和/或胚胎/胎兒發育。部分流行病學研究數據顯示，在懷孕早期使用前列腺素合成酶抑制劑會提高流產、心臟畸形之風險。動物實驗已證實使用前列腺素合成酶抑制劑會導致著床前/後胚胎損失率及胚胎/胎兒致死率增加；此外，曾有動物實驗報告指出，於器官形成期使用前列腺素合成酶抑制劑之動物，其胚胎畸形(包括心血管畸形)之發生率增加。

7 交互作用

目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應



8.1 臨床重要副作用/不良反應

目前尚無資訊。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

目前尚無資訊。

10.2 藥效藥理特性

- 富帝芬貼片具有止痛或抗發炎作用，其成份Flurbiprofen主要是用於緩解輕度或中度之疼痛，緩解發炎的症狀。
- 富帝芬貼片是利用水溶性聚合體生產之經皮膚吸收劑，具筋骨之消炎及鎮痛效果，具清涼感之貼片劑。
- 本品因呈弱酸性與皮膚一樣。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

12g(10cm×14cm)、8.4g(7cm×14cm)、17.14g(10cm×20cm)/片×(1-1000)片鋁箔袋裝。

13.2 效期

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

避免日光直射，貯存於30°C以下乾燥陰涼處。

製造廠

得生製藥股份有限公司三廠

臺南市永康區王行里環工路63號

藥商

得生製藥股份有限公司三廠

臺南市永康區王行里環工路63號