



"德山"菲比藥膠布

FLURBI PAP "D.S."

衛署藥製字 第 043493 號

須由醫師處方使用

版本日期 2024-05-28

1 性狀

1.1 有效成分及含量

每片10q(14cm x 10cm不含不織布、離形紙)中含有 Flurbiprofen 40mq

1.2 賦形劑

Purified Water , Gelatin, Tartaric Acid, Alcohol, L-Menthol, Polysorbate 80, Sorbitan Sesquioleate, Glycerin, Kaolin, Titanium Oxide, Methyl Paraben, Sodium Polyacrylate, Sodium Carboxymethylcellulose, Sorbitol Solution 70%, Polyacrylic acid, Nikasol TS-620。

1.3 劑型

水性藥膠布

1.4 藥品外觀

類白色藥膠布

2 適應症

變形性關節症、肩關節周圍炎、肌腱腱鞘炎、腱周圍炎、上腕骨上髁 炎、筋肉痛、外傷後之腫脹、疼痛等諸症狀的鎮痛、消炎。

3 用法及用量

3.1 用法用量

1. 通常一日一次貼於患部，慢性病患者或重症者，一日換貼2~3次，可切割成適當大小，剝去表面薄紙，貼於患部。 2. 流汗時，請先將患部擦乾再予貼上。 3. 於關節等易脫落之部位，可用護膠或伸縮繃帶固定。

4 禁忌

目前尚無資訊

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

「懷孕30週以上之孕婦使用非類固醇抗發炎藥(NSAIDs)可能導致胎兒心臟導管過早閉合和肺動脈高壓，應避免使用。懷孕20週或以上之孕婦使用非類固醇抗發炎藥(NSAIDs)可能導致胎兒腎臟功能不全(fetal renal dysfunction)、羊水過少(oligohydramnios)，甚至新生兒腎臟損傷(renal impairment)。若醫療專業人員認為病人有必要於孕期20至30週時使用非類固醇抗發炎藥，則應限制以最低有效劑量及最短期間治療。若治療時間超過48小時，醫療專業人員應考慮使用超音波監測羊水狀態。」

5.2 請勿使用於下列部位:(1)眼睛四周，黏膜處。(2)濕疹、癢疹、傷口等部位。

5.3 對藥物化妝品等有過敏症狀者(例如發疹、潮紅、搔癢、癢疹等)使用前須請教醫師或藥師。

5.4 兒童須在保護者指導監督下，才可使用。

5.5 本品應置於兒童不易拿到之處。

5.6 使用後將開封鍊條壓平或將開封口壓折，以防空氣進入，確保品質。

5.7 2歲以下兒童之使用須詢問醫師或藥師。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

「抑制前列腺素合成可能會影響懷孕和/或胚胎/胎兒發育。部分流行病學研究數據顯示，在懷孕早期使用前列腺素合成酶抑制劑會提高流產、心臟畸形之風險。動物實驗已證實使用前列腺素合成酶抑制劑會導致著床前/後胚胎損失率及胚胎/胎兒致死率增加；此外，曾有動物實驗報告指出，於器官形成期使用前列腺素合成酶抑制劑之動物，其胚胎畸形(包括心血管畸形)之發生率增加」

7 交互作用

目前尚無資訊

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

目前尚無資訊

9 過量

目前尚無資訊

10 藥理特性

10.1 作用機轉

目前尚無資訊

10.2 藥效藥理特性

本品為一水性貼布清涼透氣、撕貼容易，能滲入皮膚組織及關節患部，可促進血液循環，鎮痛消腫，藥效溫和。對於關節炎、肩、腰、腿部肌肉酸痛及運動傷害之發炎紅腫，均有良好的療效。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊

13 包裝及儲存

13.1 包裝

(10cm x 14cm)/片,1000片以下鋁箔袋裝

13.2 效期

2年

113.05.28

13.3 儲存條件

儲存於30°C以下



德山製藥股份有限公司

嘉義縣民雄鄉民雄工業區中山路38號

藥商

德山製藥股份有限公司

嘉義縣民雄鄉民雄工業區中山路38號