



抗原蟲製劑

服樂淨[®]

Frothin[®]

栓劑
Suppositories

服樂淨栓劑係採用具有抗原蟲作用之 Metronidazole 為主劑而以水溶性基劑製成栓劑形式，以避免 Metronidazole 經口服用時可能產生輕微之消化器障害，所以堪稱為對毛滴蟲(Trichomonas)感染諸症之一良好治療劑。

【成分】
每粒中含：
Metronidazole.....250mg

【特徵】
1. 本藥對毛滴蟲作用極強，具有阻止其增殖作用，在四十萬倍之本藥水溶液於 24 小時內即可殺滅 99 % 之毛滴蟲。
2. 原蟲之再現率極低。
3. 不抑制 Doderlein 酸桿菌之發育。

【適應症】
陰道滴蟲感染所引起之陰道炎。

【用法用量】
成人一日一次，每次一粒塞入陰道深部(約至食指第二節處)使用之，需繼續投與 10 ~ 21 天，並於治療終了後最少於三個月內每 1 ~ 2 週或每次月經完了後必須再做毛滴蟲之檢查，如再發現必須治療至完全消失為止。本藥須由醫師處方使用。


【禁忌】
曾對 Metronidazole 或其他 Nitroimidazole 衍生物有過敏性者。

【副作用】
1. 有時有搔癢感、腔壁充血和局部發紅等過敏症狀。
2. 治療期間有陰道處念珠菌增生現象。


【注意】
避免內服。

【剝取栓劑之方法】


① 由塑膠片上撕開一個。



② 由指示處撕開塑膠後取出。




【栓劑之插入法】



如上圖。用食指輕按栓劑之底部，再插入陰道內。

【保存上之注意】
1. 為保持本栓劑之品質，請放置於陰涼或避免日光直射之處。
2. 為避免小孩隨意取用，請放置於小孩不易取得之處。
3. 請依外包裝標示，於有效期限內使用完畢。

【注意】
本栓劑之配製，旨在於體溫溶化後，即呈現效果。故保存之溫度高於體溫時，極易產生軟化、變形等現象。尤其在夏天更易產生溶化之現象，然栓劑之效果絕不致發生變化。如產生軟化，而致使用困難時，請按下列方法，俟凝固後再行使用。
1. 栓劑之形態變形時，照原塑膠包裝型態，浸入於溫水(約 40 ~ 50 °C)中，軟化後再按右圖，浸於冷水(20 °C 以下)即可凝固。
2. 栓劑如軟化或溶化時，請按右圖，浸於冷水(20 °C 以下)即可凝固。



【包裝】
5'S, 10'S, 30'S, 50'S, 100'S, 200'S 瓶裝，罐裝。

永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台灣省台中縣大甲鎮中山路 1 段 1191 號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台灣省台中縣大甲鎮日南里工九路 27 號



2140918