

蒙得莎凝膠
MUNDISAL[®] Gel

衛署藥輸字第 021417 號

《組 成》

每公克凝膠含主成份 choline salicylate 87.1 mg。賦形劑：cetalkonium chloride、ethanol、sodium cyclamate、menthol、oil of anise、glycerol、hypromellose、purified water 及 43% (w/w) alcohol。

《適應症》

發炎、疼痛、單純皰瘡。

《禁忌症》

對 salicylic acid 及 salicylate 或本藥品的其它成份過敏者。

孕婦或授乳婦女 無特別的建議。

小孩 本藥品含有 43%(v/v)酒精，應限於必須使用的情況下使用。(請參考注意事項與警語。)

老年人 無特別的建議。

《注意事項與警語》

本藥品含 43% (v/v)酒精，應限於必須使用的情況下使用。同時使用時必須依照藥物投予時間間隔。

《藥物間相互作用》

Choline salicylate 與 coumarin 衍生物(抗凝血劑)併服時，會增強其作用。

《用法與用量》

醫師藥師藥劑生指示藥品。

除非醫師已給予不同藥物，否則應遵照下列指示使用。

將本藥品塗抹於疼痛或感染部位，再以潔淨手指輕輕按摩。僅需給予如豌豆般的藥量就足夠。

藥品凝膠本身會形成一層膜，緊緊蓋住疼痛或感染部位。依照症狀的嚴重程度，可每隔 2~3 小時使用一次。

原則上，治療進行數天後應停藥。若需較長的治療期，應先請教醫師。

《藥物過量與不正確使用》

使用 Salicylate 過量的症狀是呼吸增加、噁心、嘔吐、耳鳴與精神紊亂的狀態。若是嚴重性中毒會出現譫妄(精神錯覺)、寒顫發抖、發汗、體溫過高、昏迷與體內酸鹼不平衡。

《副作用》

使用本藥品後會出現暫時性不舒適(如：灼熱感)。如果出現本藥品仿單未刊載的副作用時，請告知醫師或藥師。

《保存方法》

產品包裝外盒與鋁管上有標示藥品的使用期限。一旦超過有效期限，請勿使用。

本藥品貯存溫度不得超過 25°C。請置放於兒童不易取得處。

《包裝》

1000 公克以下鋁管裝。每管 10 公克裝。

《製造廠》

MUNDIPHARMA GmbH

Mundipharma Str. 2, D-65549 Limburg / Lahn, Germany.

《藥商》

嘉德藥品企業有限公司

台北市富錦街 485 號

(02)2767 8276 (02)2507 8921

MUNDISAL 為註冊商標。本藥品是經由 Mundipharma Medical Company, Bermuda 授權製造。