

1

內衛藥製字第010577號

皮膚用腎上腺皮質荷爾蒙製劑

臨得隆® 乳膏**RINDERON-V CREAM**

臨得隆乳膏，係含有Betamethasone valerate之製劑。


Betamethasone valerate 係從數十種之 Betamethasone 衍生物中挑選之對局部具有抗炎症作用。

【成份】

乳膏用乾性雪花膏型之基劑，每1g中含有

Betamethasone valerate 0.6mg

(相當於Betamethasone 0.5mg)。



【適應症】

濕疹或皮膚炎。

【用法及用量】

醫師藥師藥劑生指示藥品。

塗於患部。

【使用注意事項】

1. 注意事項

- (1)須置於小孩接觸不到之處。
- (2)避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- (3)除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- (4)勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
- (5)除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。
- (6)除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
- (7)使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
- (8)除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。
- (9)塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
- (10)深部皮膚組織感染請就醫治療。
- (11)除非藥師、藥劑生或醫師指示，類固醇抗發炎劑不可連續使用超過二星期。

2. 警語

- (1)對藥物各成分過敏者不得使用。
- (2)小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。
- (3)癬類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。
- (4)臉部、腋下及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。
- (5)皮膚的黴菌感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。

3. 副作用

- (1)局部性：搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、瘡子、毛細管擴張。
- (2)全身性：庫欣氏症候群(Cushing's syndrome，如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)、繼發性腎上腺功能不足(secondary adrenal insufficiency，如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等)。

【包裝】

1000公克以下鋁軟管裝。

委託者：台灣塩野義製藥股份有限公司

台北市南京東路二段2號4樓
電話：(02)25516336(代表號)

製造廠：杏輝藥品工業股份有限公司

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號
電話：(03)9581101(代表號)