



"杏輝" 杏化乳膏

SINPHARDERM CREAM "SINPHAR"

衛署藥製字 第 020892 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2023-03-14

杏化乳膏是一種角質軟化劑，能緩解皮膚乾裂現象。

【作用】本藥主成分 Urea 具有角質溶解作用，對腳、掌之異常角化具軟化剝離效果。

1 成分

1.1 有效成分及含量

每gm含：

Urea.....100mg

1.2 其他成分(賦形劑)

原味:

White petrolatum、Liquid petrolatum、Propylene glycol、Cetyl stearyl alcohol、Span 60、Tween 60、Methyl paraben、Propyl paraben、Water purified.

花香味:

White petrolatum、Liquid petrolatum、Propylene glycol、Cetyl stearyl alcohol、Span 60、Tween 60、Methyl paraben、Propyl paraben、Fragrance、Water purified.

2 用途(適應症)

去角質。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 有深部皮膚組織感染。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生


3.3.1 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.3.2 正在接受醫師治療。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 兒童需於監護者的指導與監督下使用。



- 3.4.3 避免陽光直射。
- 3.4.4 勿超過建議使用量或使用次數。
- 3.4.5 使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。
- 3.4.6 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
- 3.4.7 本藥限於外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)。
- 3.4.8 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
- 3.4.9 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
- 3.4.10 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
- 3.4.11 本藥不是化妝品，不可用於臉部基礎化妝。
- 3.4.12 患部有下列狀況者，建議不要使用。
 1. 有傷口或紅腫。
 2. 傷口流膿或潰爛。
 3. 傷口有結痂剝離的情形。

4 用法用量

1天1~2次	適量塗於患部
--------	--------

5 警語

- 5.1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅、發癢、刺激感。

- 5.2 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

- 5.2.1 若有上述外之其他不適情況產生。
- 5.2.2 連續使用7天後症狀未改善或更惡化。

6 包裝


1000公克以下塑膠瓶裝、塑膠管裝、積層鋁管裝，3800公克塑膠瓶裝。

7 儲存方式

30℃以下保存。

8 給皮燥患者的治療建議

- 8.1 避免直接接觸刺激性物質，如：清潔劑或化學藥劑。
- 8.2 必須在潮濕環境下工作時膚乾應配戴非橡膠材質手套，或在手套內置入棉質內襯。



8.3 選用低皂鹼的香皂及用溫水洗手。

8.4 使用含保濕成分之皮膚藥膏來幫助症狀的改善。



製造廠

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

藥商

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號