

散克巴®點眼液

Sancoba® ophthalmic solution

Cyanocobalamin 點眼液

Santen

發現存於肝臟之抗貧血因子，Vitamin B₁₂ (cyanocobalamin)，隨着近來研發之成效，其物質代謝之生化學性作用越為明顯，因而在臨床應用上適應症遍及多元化。由於 Vitamin B₁₂ 特別與神經組織有親和性。

本劑係將 Vitamin B₁₂ (cyanocobalamin) 製成點眼劑，藉由 Vitamin B₁₂ (cyanocobalamin) 之點眼投與改善調節功能，特別對調節性眼睛疲勞發揮藥效。

〔組成、性狀〕

散克巴點眼液含有濃度為0.02%之cyanocobalamin (Vitamin B₁₂)，無菌紅色透明水性點眼液。添加物含有 benzalkonium chloride，boric acid，sodium borate。pH值為5.5～6.5、滲透壓比約1左右。

〔適應症〕

眼睛疲勞

〔類 別〕

醫師藥師藥劑生指示藥品

〔用法、用量〕

一天3至6次，每次1至2滴。

〔注意事項〕

- (一)為防止兒童誤食請妥善保管。
- (二)避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- (三)使用前，請洗淨雙手。
- (四)請依照藥品標示使用。
- (五)過期眼藥水，請勿使用。瓶裝之眼藥水，開瓶30天後請勿繼續使用。
- (六)藥液混濁、變色或出現異物時請丟棄。
- (七)為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口。
- (八)使用兩種眼藥水時，請隔開至少5分鐘後點藥。
- (九)使用兩種眼藥時，請先使用藥水再用藥膏；並請隔開至少10分鐘後點藥。

〔警語〕

- (一)以下情況應停藥立即就醫：
 - (A)連續使用三天（或72小時）症狀未解除。
 - (B)使用後產生眼睛劇痛、視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
 - (C)發生過敏反應。
 - (D)青光眼（Glaucoma）患者。
- (二)對眼用製劑之主要成分、防腐劑或其他賦形劑過敏者，不推薦使用。
- (三)正在接受醫師治療或醫師處方眼藥之患者，不應自行購買使用。

〔藥效藥理〕

1. 機能改善調節作用¹⁾

調節性眼睛疲勞病患對本劑之調節機能所產生之影響，使用調節時間反覆測定、調節運動測定以及微動調節測定，與對照組比較雙盲試驗之結果，其調節時間及調節運動有改善之傾向，微動調節則比起對照組獲得較有意之改善效果。

2. 組織呼吸增加作用

（白色家兔〈*in vitro*〉，大白鼠〈*in vitro*，*in vivo*〉）

對白色家兔之視網膜浮游液中添加0.0025、0.025、0.1、0.5、5.0、10.0、50.0、100.0μg/ml之cobamamide（輔酵素型維他命B₁₂），視網膜之氧消耗量皆呈現增強，其程度可認出用量之依存性。²⁾

〔主要文獻〕

- 1) 鈴村昭弘：日本眼科紀要 28, 340 (1977)
- 2) 手島 仁：日本眼科學會雜誌 73, 1711(1969)

〔貯藏上之注意〕

貯藏方法：避免日光、螢光燈直射，室溫保存（1-30℃）。

有效期限：外盒及標籤上記載（3年）

〔包 裝〕

5公撮×10瓶裝

製造廠 **SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.**
Noto plant : 2-14, Shikinami, Hodatsushimizu-cho, Hakui-gun, Ishikawa, Japan
Office : 3-9-19, Shimoshinjo, Higashiyodogawa-ku, Osaka, Japan

藥 商 **大明產業股份有限公司**
台北市長安西路106號4樓之3