

局部腫脹治療劑

"正和" **愛新凝膠** 15毫克/公克(艾士辛)

AESCIN Gel 15 mg/g "C.H." (Escin)

【作用】

Aescin 由於具有活性素 β -Escin (其具有保護及振奮微血管微循環的性質) 故有鎮痛及抗腫的作用。能使浮腫消失，促使毛細管膜恢復正常之滲透性，具有保護血管壁，特別是毛細血管膜，並增強其抗滲透力；具有抗炎的性能，得能矯正組織發炎症狀。

【成份】每公克凝膠含有：

Escin.....15 mg

【適應症】

改善慢性靜脈功能不全引起局部腫脹之輔助療法。

【用法用量】

取出約一豌豆之量，直接塗在要治療的病變處。如果病變範圍需要使凝膠均勻，請輕輕按摩腫脹部位，也可以棉花棒塗抹。五天之內一天平均塗抹五次。
本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

1. 二歲以下兒童之使用須詢問醫師或藥師。
2. 請放在小孩拿不到的地方。

【包裝】

1000公克以下鋁管、PE軟管及塑膠瓶裝

【儲存】

請貯存於25°C以下。

【賦形劑】

Propylene Glycol、Sodium Carboxymethyl Cellulose、Sodium Benzoate、
Polysorbate、Alcohol 95%、Menthol、Melatti Flavor、Purified Water。
衛署藥製字第040458號

正和製藥股份有限公司新營廠

台南市新營區新工路23號(新營工業區)